

*Standard der europäischen
Vögel*



Edition 2012

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	17
Erlenzeisig männl. (<i>Carduelis spinus</i>).....	23
~ Phénotype wildfarben ~	23
Erlenzeisig weibl. (<i>Carduelis spinus</i>).....	24
~ Phénotype wildfarben ~	24
Erlenzeisig männl. (<i>Carduelis spinus</i>).....	25
~ Mutation braun ~	25
Erlenzeisig weibl. (<i>Carduelis spinus</i>).....	26
~ Mutation braun ~	26
Erlenzeisig männl. (<i>Carduelis spinus</i>).....	27
~ Mutation braun verdünnt (pastell) ~	27
Erlenzeisig weibl. (<i>Carduelis spinus</i>).....	28
~ Mutation braun verdünnt (pastell) ~	28
Erlenzeisig männl. (<i>Carduelis spinus</i>).....	29
~ Mutation braun doppel pastell	29
Erlenzeisig weibl. (<i>Carduelis spinus</i>).....	30
~ Mutation braun doppel pastell.....	30
Erlenzeisig männl. (<i>Carduelis spinus</i>).....	31
~ Mutation Isabell ~	31

Erlenzeisig weibl. (Carduelis spinus).....	32
~ Mutation Isabell ~	32
Erlenzeisig männl. (Carduelis spinus).....	33
~ Mutation Isabell doppel pastell ~	33
Erlenzeisig weibl. (Carduelis spinus).....	34
~ Mutation Isabell doppel pastell ~	34
Erlenzeisig männl. (Carduelis spinus).....	35
~ Mutation Achat ~	35
Erlenzeisig weibl. (Carduelis spinus).....	36
~ Mutation Achat ~	36
Erlenzeisig männl. (Carduelis spinus).....	37
~ Mutation Achat pastell ~	37
Erlenzeisig weibl. (Carduelis spinus).....	38
~ Mutation Achat doppel pastell ~	38
Erlenzeisig männl. (Carduelis spinus).....	39
~ Mutation Isabell ~	39
Erlenzeisig weibl. (Carduelis spinus).....	40
~ Mutation Isabell ~	40
Erlenzeisig männl. (Carduelis spinus).....	41
~ Mutation Isabell doppel pastell ~	41
Erlenzeisig weibl. (Carduelis spinus).....	42
~ Mutation Isabell doppel pastell ~	42

Erlenzeisig männl. (<i>Carduelis spinus</i>).....	43
~ Mutation Elfenbein ~	43
Erlenzeisig weibl. (<i>Carduelis spinus</i>).....	44
~ Mutation Elfenbein ~	44
Erlenzeisig männl. (<i>Carduelis spinus</i>).....	45
~ Mutation Achat Elfenbein ~	45
Erlenzeisig weibl. (<i>Carduelis spinus</i>).....	46
~ Mutation Achat Elfenbein ~	46
Birkenzeisig (<i>Carduelis flammea cabaret</i>).....	48
~ Phénotype wildfarben ~	48
Birkenzeisig geflammt (<i>Carduelis flammea flammea</i>).....	49
~ Phénotype wildfarben ~	49
Birkenzeisig.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Mutation braun	50
Birkenzeisig.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation Achat pastel ~	51
Birkenzeisig.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation braun pastel ~	52
Birkenzeisig.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation Schildpatt	53
Birkenzeisig.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation braun Schildpatt ~	54

Birkenzeisig.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation verdunkelt ~	55
Birkenzeisig.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation dunkel pastell ~	56
Birkenzeisig.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation braun verdunkelt ~	57
Birkenzeisig.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation phaéo ~	58
Birkenzeisig weißlich (<i>Carduelis hornemanni</i>)	59
~ Phénotype wildfarben ~	59
amerikanischer Fink (<i>Carduelis carduelis</i>)	65
~ Phénotype wildfarben ~	65
amerikanischer Fink.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation braun ~	66
amerikanischer Fink.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation Achat ~	67
amerikanischer Fink.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation Pastell ~	68
amerikanischer Fink.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation Isabell ~	69
amerikanischer Fink.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation Satin ~	70

amerikanischer Fink.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation weiß mit orangefarbener Maske ~	71
amerikanischer Fink.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation weißer Kopf ~	72
amerikanischer Fink.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation gelblich ~	73
amerikanischer Fink.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation aminet ~ (zuvor fälschlich als Eumo)	74
Grünfink männl. – Europa-Hahn (Carduelis chloris chloris).....	78
~ Phénotype wildfarben ~	78
Grünfink weibl. – Europa-Weib (Carduelis chloris chloris)	79
~ Phénotype wildfarben ~	79
Grünfink männl. – Europa-Hahn.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation Isabell ~	80
Grünfink weibl. – Europa-Weib	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation Isabell ~	81
Grünfink männl. – Europa-Hahn.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation Achat ~	82
Grünfink weibl. – Europa-Weib	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation Achat ~	83
Grünfink männl. – Europa-Hahn.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation braun ~	84

Grünfink weibl. – Europa-Weib	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation braun ~	85
Grünfink männlk. – Europa-Hahn	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation Satin ~	86
Grünfink weibl. – Europa-Weib	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation Satin ~	87
Grünfink männl. – Europa-Hahn.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation Lutino ~	88
Grünfink weibl. – Europa-Weib	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation Lutino ~	89
Grünfink.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation Pastell ~	90
Grünfink männl.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation Achat pastell (vorläufige Bezeichnung)~	91
Grünfink weibl.	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation Achat pastell (vorläufige Bezeichnung) ~	92
Grünfink	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation Isabell pastell (vorläufige Bezeichnung) ~	93
Grünfink	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation braun pastell (vorläufige Bezeichnung) ~	94
Hänfling Hahn (Carduelis cannabina)	96
~ Phénotype wildfarben ~	96

Hänfling weibl. (<i>Carduelis cannabina</i>)	97
~ Phénotype wildfarben ~	97
Hänfling gelb (<i>Carduelis flavirostris</i>)	99
~ Phénotype wildfarben ~	99
Gimpel (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	105
~ Phénotype wildfarben ~	105
Gimpel	106
~ Mutation Pastell ~	106
Gimpel männl. Fehler! Textmarke nicht definiert.	
Mutation braun ~	107
Gimpel weibl.....	108
~ Mutation braun ~	108
Gimpel männl. Fehler! Textmarke nicht definiert.	
~ Mutation braun pastell ~	109
Gimpel weibl. Fehler! Textmarke nicht definiert.	
~ Mutation braun pastell ~	110
Gimpel	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation weiß ~	111
Gimpel	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation gelb ~	112
Gimpel	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation braun gelb pastell ~	113

Gimpel männl.	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation Topas ~	114
Gimpel weibl.	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation Topas ~	115
Buchfink männl. (Fringilla coelebs).....	118
~ Phénotype wildfarben ~	118
Buchfink weibl. (Fringilla coelebs)	119
~ Phénotype wildfarben ~	119
Buchfink männl.	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation braun ~	120
Buchfink weibl.	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation braun ~	121
Buchfink männl.	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation Achat ~	122
Buchfink weibl.	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation Achat ~	123
Buchfink männl.	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation Opal ~	124
Buchfink weibl.	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation Opal ~	125
Buchfink	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation braun Opal ~	126

Bergfink männl. (<i>Fringilla montifringilla</i>).....	128
~ Phénotype wildfarben ~	128
Bergfink weibl. (<i>Fringilla montifringilla</i>)	129
~ Phénotype wildfarben ~	129
Girlitz männl. (<i>Serinus serinus</i>).....	132
~ Phénotype wildfarben ~	132
Girlitz weibl. (<i>Serinus serinus</i>).....	133
~ Phénotype wildfarben ~	133
Zitronengirlitz männl. (<i>Serinus cintrinella</i>)	135
~ Phénotype wildfarben ~	135
Zitronengirlitz weibl. (<i>Serinus cintrinella</i>).....	136
~ Phénotype wildfarben ~	136
Zitronengirlitz Korsika (<i>Serinus cintrinella corsica</i>)	137
~ Phénotype wildfarben ~	137
Fichtenkreuzschnabel männl. (<i>Loxia curvirostra</i>).....	140
~ Phénotype wildfarben ~	140
Fichtenkreuzschnabel weibl. (<i>Loxia curvirostra</i>)	141
~ Phénotype wildfarben ~	141
Bindenkreuzschnabel männl. (<i>Loxia leucoptera</i>)	143
~ Phénotype wildfarben ~	143
Bindenkreuzschnabel weibl. (<i>Loxia leucoptera</i>).....	144
~ Phénotype wildfarben ~	144

Kiefernkreuzschnabel männl. (<i>Loxia pytyopsittacus</i>).....	146
~ Phénotype wildfarben ~	146
Kiefernkreuzschnabel weibl. (<i>Loxia pytyopsittacus</i>)	147
~ Phénotype wildfarben ~	147
Hakengimpel männl. (<i>Pinicola enucleator</i>).....	151
~ Phénotype wildfarben ~	151
Hakengimpel weibl. (<i>Pinicola enucleator</i>)	152
~ Phénotype wildfarben ~	152
Kernbeißer männl. (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)	155
~ Phénotype wildfarben ~	155
Kernbeißer weibl. (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>).....	156
~ Phénotype wildfarben ~	156
Wüstengimpel (<i>Rhodopechys githaginea</i>)	159
~ Phénotype wildfarben ~	159
Haussperling männl. (<i>Passer domesticus</i>).....	162
~ Phénotype wildfarben ~	162
Haussperling weibl. (<i>Passer domesticus</i>).....	163
~ Phénotype wildfarben ~	163
Haussperling männl.	164
~ Mutation braun ~	164
Haussperling weibl. Fehler! Textmarke nicht definiert.	
~ Mutation braun ~	165

Haussperling männl.	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation phaéo ~	166
Haussperling weibl.	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation phaéo ~	167
Haussperling männl.	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation Achat ~	168
Haussperling weibl.	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation Achat ~	169
Haussperling männl.	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation Opal ~	170
Haussperling weibl.	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation Opal ~	171
Haussperling männl.	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation braun pastell ~	172
Haussperling weibl.	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation braun pastell ~	173
Haussperling	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation ino (ex-albino)~	174
Haussperling	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation weiß ~	175
Haussperling	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation männl. Satine ~	176

Haussperling	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation weibl. Satine ~	177
Feldsperling (<i>Passer montanus</i>).....	178
~ Phénotype wildfarben ~	178
Feldsperling	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation Opal ~	179
Feldsperling	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation braun ~	180
Feldsperling	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation braun Opal ~	181
Spanischer Sperling (<i>Weidensperling</i>)	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ <i>Passer hispaniolensis</i> ~	182
Steinsperling	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ <i>Petronia petronia</i> ~	184
Niverolle	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Schneesperling ~	186
Seidenschwanz (<i>Bombycilla garrulus</i>)	190
~ Phénotype sauvage ~	190
schwarze Amsel männl. (<i>Turdus merula</i>).....	193
~ Phénotype wildfarben ~	193
schwarze Amsel weibl. (<i>Turdus merula</i>).....	194
~ Phénotype wildfarben ~	194

schwarze Amsel männl.	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation pastell ~	195
schwarze Amsel weibl.	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation pastell ~	196
schwarze Amsel	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation ino (ex-albino)~	197
schwarze Amsel	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation weiß ~	198
Singdrossel (Turdus philomelos)	199
~ Phénotype wildfarben ~	199
Singdrossel	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation braun ~	200
Singdrossel	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation weiß ~	201
Singdrossel	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation satin	202
Misteldrossel	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Turdus viscivorus ~	203
Rotdrossel	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Turdus iliacus ~	205
Wacholderdrossel	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Turdus pilaris~	207

Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	210
~ Phénotype wildfarben ~	210
Star	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation braun ~	211
Star	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation Achat ~	212
Star	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation phaèò ~	213
Star	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation weiß ~	214
Star	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation pastell ~	215
Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius</i>)	218
~ Phénotype wildfarben ~	218
Eichelhäher	Fehler! Textmarke nicht definiert.
~ Mutation Opal ~	219
Elster (<i>Pica pica</i>).....	221
~ Phénotype wildfarben ~	221
Elster (<i>Pica pica</i>).....	222
~ Mutation braun ~	222
Dohle (<i>Corvus monedula</i>).....	224
~ Phénotype wildfarben ~	224

Aaskrähe (<i>Corvus corone corone</i>).....	225
~Phénotype wildfarben ~	225
Saatkrähe (<i>Corvus frugilegus</i>).....	226
~Phénotype wildfarben ~	226
Nebelkrähe (<i>Corvus corone cornix</i>)	227
~ Phénotype wildfarben ~	227
Kolkrabe (<i>Corvus corax</i>)	228
~ Phénotype wildfarben ~	228
Die Bewegungen der europäischen Vögel durch die COM/OMJ genehmigt	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Zusammenfassung

Finken 20

➤ Art <i>Carduelis</i>	21
➤ Zeisig und Mutation	22
➤ Birkenzeisig	47
➤ Birkenzeisig	48
➤ Birkenzeisig geflammt und Mutation	49
➤ Birkenzeisig weißlich	59
➤ Amerikanischer Fink und Mutation	60
➤ Grünfink - Europahahn - und Mutation	76
➤ Hänfling	95
➤ Hänfling gelb	98
➤ Art <i>Pyrrhula</i>	100
➤ Gimpel und Mutation	100
➤ Art <i>Fringilla</i>	116
➤ Buchfink und Mutation	117
➤ Bergfink und Mutation	127
➤ Art <i>Serinus</i>	130
➤ Girlitz	131

➤ Zitronengirlitz	134
➤ Girlitz Korsika	137

➤ Art <i>Loxia</i>	138
➤ Fichtenkreuzschnabel	139
➤ Bindenkreuzschnabel	142
➤ Kiefernkreuzschnabel	145
➤ Art <i>Pinicola</i>	148
➤ Hakengimpel	149
➤ Art <i>Coccothraustes</i>	153
➤ Kernbeißer	154
➤ Art <i>Rhodopechys</i>	157
➤ Wüstengimpel	158

Sperlinge 160

➤ Art <i>Passer</i>	161
➤ Haussperling und Mutation	162
➤ Feldsperling und Mutation	178

➤ Spanischer Sperling (Weidensperling)	182
➤ Art <i>Petronia</i>	183
➤ Steinsperling	184
➤ Art <i>Montifringilla</i>	185
➤ Schneesperling	186
<u>Bombycillidés</u>	188
➤ Art <i>Bombycilla</i>	189
➤ Seidenschwanz	190
<u>Turdidés</u>	191
➤ Art <i>Turdus</i>	192
➤ Schwarze Amsel und Mutation	193
➤ Singdrossel und Mutation	199
➤ Misteldrossel	203
➤ Rotdrossel	205
➤ Wacholderdrossel	207
<u>Sturnidés</u>	208
➤ Art <i>Sturnus</i>	209
➤ Star und Mutation	210

<u>Corvidés</u>	216
➤ Art <i>Garrulus</i>	217
➤ Eichelhäher und Mutation	218
➤ Art <i>Pica</i>	220
➤ Elster	221
➤ Art <i>Corvus</i>	223
➤ Dohle	224
➤ Aaskrähe	225
➤ Saatkrähe	226
➤ Nebelkrähe	227
➤ Kolkrabe	228
<u>Topographie eines Vogels</u>	229
<u>Formen und Größen</u>	230
<u>Genetische Mutationen</u>	231

Beteiligten sich an der Entwicklung des Standard :

Jacques Faivre, François Vuillaume, Enrique Gomez, Lionel Durochat.

Dokumentation : UOF, FOI, FOA, KBOF

Fotografien: P. Rocher, E. Gomez, S. Chartier, R. Driesmans, J.-M. Eytorff, B. Comelieu, A Cupido, Cazadilla, L. Durochat, R. Rojas, A. Van Mingeroet

Dankeschön an die Autoren für die Erlaubnis ihre Bilder zu veröffentlichen.

Ein besonderes Dankeschön geht an Hermann Heinzl für seine Illustrationen.

23 Juli 2012

Vervielfältigungen und die Verwendung dieser Materialien ist ohne die Erlaubnis ihrer Autoren und dem COM/OMJ verboten.

Fringillidés

Finken

Art Carduelis



(*Carduelis spinus*)

Zeisig



Zeisig männlich (Carduelis spinus)
~ Phénotype wildfarben ~

Größe : 11 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Schwarz bis leicht grau punktiert
Wange	Gelb-gräulich leicht verschleiert
Augenbrauenstreifen	Auge bis Nacken gelblich
Kehle, Rücken	Grünlich mit feinen dunklen Strichelungen
Brust	Gelblich-grün. Manche Männchen haben auf dem oberen Teil der Kehle einen kleinen schwarzen Latz, er muß klein und regelmäßig sein.
Flanken	Grünlich grau mit schwarzen Streifen, die sehr regelmäßig sein müssen.
Bauch	Leicht gräulich
Flügel	Große schwarze Federn mit bräunlich-gelben Federkielen. Gräulich am Ende des Gefieders. Gelbe Flügel und kleine gelbe Segel.
Bürzel	Gelblich-grün
Schwanz	erste zwei Drittel gelb, letzte Drittel schwarz
Schnabel	Fein, spitz, Horn dunkel, schwarz geflammt
Augen	dunkelbraun
Ständer	fleischfarben
Krallen	schwarz



Photo Rocher Philippe

Beachten : Jungvögel dürfen leichte Gläser

Zeisig weiblich (Carduelis spinus)
~ Phénotype wildfarben ~

Größe : 11 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Grau mit feinen Streifen durchsetzt
Wange	Bräunlich gelb verschleiert
Augenbrauenstreifen	Viel weniger gelb als die Hähne sondern graubraun
Kehle, Rücken	Fein gräulich schwarzbraun gestreift
Brust, Flanken	Ganz gräulich. Die Flanken des Brustkorbs und vor allem die Seiten haben schöne Streifen, sehr regelmäßige klare dunkelbraune Farbe
Bauch	gräulich
Flügel	Dunkelgrau mit den gleichen Merkmalen wie das Männchen
Bürzel	Grünlich-gelb, leicht dunkelgraue Streifen
Schwanz	Die ersten zwei Drittel gelb, der Rest ist schwarz-grau, schwarz-graues Gefieder
Oberer Schwanz	Vorhandensein einer markanten Zeichnung
Schnabel	helle Hornfarbe, schwarz geflammt
Augen	dunkelbraun
Ständer	Dunkle Fleischfarbe
Krallen	schwarz



Geschlechtsunterschiede: Weibchen müssen gleichmäßig ausgefärbt sein, Untergrund kann grauer sein.

Zeisig männlich (Carduelis spinus)
~ Mutation braun ~

Größe : 11 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Sehr dunkelbraun. Die Kappe ist meliert und beige überhaucht
Wange	Grünlich-gelb bis braun.
Augenbrauenstreifen	gelb
Kehle	Wenn vorhanden dunkelbraun
Brust	Grünlich-beige
Bürzel	Grünlich-gelb
Schwanz	Die ersten zwei Drittel gelb und mit dunkelbraunem Ende. Mittlere Schwanzfeder dunkelbraun.
Flügel	Großgefieder dunkelbraun mit einem hellen gelben Rand entlang der äußeren Federkiele. Grünlich-gelbe Schultern, wenn sichtbar.
Flanken	gelblich-weiß mit dunkelbraunen Streifen
Rücken	Mantel grünlich-braun gestreift mit einem hellbraunen Schleier auf der Rückseite.
Schnabel	Hornfarbig an der Basis, obere Spitze des Schnabels dunkelbraun
Augen	dunkelbraun
Ständer	braun
Krallen	dunkel

Photo Philippe ROCHER



Zeisig weiblich (Carduelis spinus)
~ *Mutation braun* ~

Größe : 11 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Grünlich-braun bis dunkelbraun gestreift
Wange	Graubraun verwaschen
Augenbrauenstreifen	gelblich
Bürzel	Leicht grünlich-gelb mit braun gestreift
Schwanz	Erste Drittel gelb und letzte zwei Drittel dunkelbraun. Mittlere Schwanzfeder dunkelbraun
Flügel	Großgefieder dunkelbraun mit einem hellen gelben Rand entlang der äußeren Federkiele, gelblicher Rand und hellgelber Spiegel.
Schulter	Grünlich-gelb, wenn sie sichtbar sind.
Brust	schmutzig weiß gestreift mit braun.
Flanken	Beige Hintergrund mit dunkelbraunen Streifen.
Rücken	Grünlich-dunkelbraun gestreift mit dunkelbraunen Federn
Schnabel	Hornfarbig an der Basis, obere Spitze des Schnabels dunkelbraun
Augen	dunkelbraun
Ständer	braun
Krallen	dunkel



Zeisig männlich (Carduelis spinus)
~ Mutation braun verdünnt ~

Größe : 11 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Braun, grün gewaschen. Scheitel beige gesäumt.
Augenbrauenstreifen	Gelb
Wange	Gelblich, braun verwaschen
Rücken	Bräunlich-grün bis dunkelbraun gestreift
Kehle, Brust	Hellgelb mit einem hellen beige Schleier, dunkelbrauner Latz, klare Brust
Flanken	Gelblich beige vorne und grau-beige Rücken. Braune Streifen.
Flügel	Grau-braune Federn, Federkiele bräunlich-gelb gesäumt. Decken mit grünlich-gelben Federn abgeschlossen
Bürzel	Grünlich-gelb bis dunkelbraun gestreift
Schwanz	Die ersten zwei Drittel gelblich-braun und grau am Ende. Mittlere Schwanzfeder graubraun, sehr dunkel. Federn unter dem Schwanz grünlich-gelb bis dunkelbraun gestreift
Schnabel	Bräunlich, dunkelbraun geflammt auf dem oberen Schnabel
Ständer	fleischfarben
Krallen, Augen	dunkelbraun

Photo UOF



Zeisig weiblich (Carduelis spinus)
~ Mutation braun verdünnt ~

Größe : 11 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Braun bis dunkelbraun gestreift
Augenbrauenstreifen	Hellgelb
Wange	Weißlich gelb bis dunkelbraun
Brust, Kehle	Hellgrau bis braun, leicht gezackt
Flanken	Streifen hellgrau bis dunkelbraun
Bürzel	Strichelung grünlich-gelb bis dunkelbraun
Rücken	Strichelung grünlich-braun bis dunkelbraun
Flügel	grau-braunen Federn mit bräunlich gelben Federkielen. Die Federdecken sind gelblich hellbraun gesäumt, welche in einem gelben Band in den Flügel übergehen
Schwanz	Gelblich-graubraun gestreift
Schnabel	Bräunlich bis dunkelbraun
Augen	Dunkelbraun
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Dunkelbraun



Zeisig männlich (Carduelis spinus)
~ Mutation braun doppelt verdünnt ~

Größe : 11 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Scheitel, Hinterkopf, Rücken	braun beige, Mantel ohne Streifen.
Augenbrauenstreifen	gelb
Wange	braun weiß gestreift
Kehle, Brust, Flanken	Etwas gelblich braun beige gestreift. Lätzchen wird praktisch unsichtbar.
Bauch	Schmutzig weiß
Decke	Beige braun; kleine, mittlere und große hellgelbe Zeichnung mit dunkelgelb.
Gefieder	Hellgraue Außenseite. Federkiele und intensiv gelber Flügel. Kein sichtbarer Spiegel.
Bürzel	Gelb mit braunen Streifen
Schwanz	Die ersten zwei Drittel gelb und hellgrau am Ende der äußeren Federkiele. Leicht graue mittlere Feder.
Schnabel	Fleischfarben geflammt an der Spitze des oberen Schnabels.
Augen	Dunkelbraun
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Leicht Hornfarben



Zeisig weiblich (Carduelis spinus)
 ~ *Mutation braun doppelt verdünnt* ~

Größe : 11 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Scheitel, Hinterkopf, Mantel	Braun beige mit einem leichten geriffelten Streifen. Mantel ohne Farbstreifen.
Augenbrauenstreifen	Hellgelb
Wange	Braun, mit weißen Streifen
Kehle, Brust	Sehr helles grau. Brust braun beige gestreift.
Flanken	Beige, mit braunen Strichelungen.
Bürzel	Gelb mit braunen Streifen.
Bauch	Schmutzig weiß.
Schwanz	Erste und letzte Drittel gelblich beige. Federkiel gelblich. Mittlere Feder beige.
Decke	Beige braun. Durchschnitt gelb bis dunkelgelb.
Gefieder	Beige Seite mit hellgelben Federkielen und Flügel. Kein sichtbarer Spiegel.
Schnabel	Fleischfarben geflammt an der Spitze des oberen Schnabels.
Augen	Dunkelbraun
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Leicht Hornfarben




Photo Philippe ROCHER

Zeisig männlich (Carduelis spinus)
~ Mutation verdünnt ~

Größe : 11 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Scheitel, Hinterkopf	Sehr dunkelgrau verwaschen grün
Augenbrauenstreifen	Gelb
Wange	verwaschen grünlich grau
Rücken	Grün dunkelgrau gestreift
Brust, Kehle	Gelblich grün hellgrau verwaschen. Lätzchen dunkelgrau, wenn es existiert.
Flanken	Hellgrau auf dem Rücken und grau grünlich meliert. Dunkelgraue Streifen.
Bauch	Schmutzig weiß
Decke	Enden in hellem Licht grün, grünes Flügelband mit grünen Schultern. Hellgelber Spiegel.
Gefieder, mittlere Schwanzfeder	Grünlich grau. Kante der äußeren Federn mit gelblichen Federkielen.
Bürzel, untere Schwanzfeder	Etwas grünlich gelb gestreift mit grau.
Schwanz	Erste zwei Drittel gelb und grünlich graues Ende.
Schnabel	Bräunlich schwarz geflammt am Ende des oberen Schnabels
Augen	Dunkelbraun
Ständer	Dunkel fleischfarben
Krallen	Dunkel



Zeisig weiblich (Carduelis spinus)
~ *Mutation verdünnt* ~

Größe : 11 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Scheitel, Kopf, Hinterkopf	Grau dunkelgrau gestreift
Augenbrauenstreifen	Gelblich
Wange	Grau braun, leicht getönt
Kehle	Leicht hellgrau mit grauen Strichelungen
Brust	Leichte graue Strichelungen mit dunkelgrau
Rücken	Grau braun, grün und dunkelgrau gestreift verdünnt
Flanken	Hell dunkelgrau gestreift mit hellbraunem Schleier
Bürzel	Grünlich gelb mit grauen Strichelungen
Schwanz	Erste und letzte Drittel gelblich grün grau. Mittlere Schwanzfeder grünlich grau. Decke hellgrau mit grau gestreift
Flügel	Grünlich graue Federn und gelbliche Außenkante der Federkiele. Decke mit grünem Rand. Hellgelber Spiegel verwaschen.
Schnabel	Bräunlich
Augen	Dunkelbraun
Ständer	Dunkel fleischfarben
Krallen	Dunkel



Zeisig männlich (Carduelis spinus)
~ Mutation doppelt verdünnt ~

Größe : 11 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Scheitel, Hinterkopf	Hellbraun grau. Scheitel mit leichter Zeichnung
Augenbrauenstreifen	Gelb
Wange	Grünlich grau klare Streifen.
Kehle	Gelblich gestreift mit braun. Lätzchen nicht sichtbar.
Brust, Flanken	Gelblich braun, leicht grau gestreift.
Bauch	Schmutzig weiß.
Rücken	Mantel grau braun schulterlang ohne Streifen
Bürzel	Gelb gestreift mit braun grau.
Schwanz	Die ersten zwei Drittel gelb und hellgrau äußeren Ende mit gelben Federkielen. Grauen Mittelfeder.
Flügeldecken	Klein :graubraun. Groß : hellgelb intensiv gelb gesäumt
Gefieder	Sekundär : hellgrau mit gelb, Federkiele mit Flügel intensiv gelb. Primär : hellgrau mit gelben äußeren Federkielen. Kein Spiegel.
Schnabel	Fleischfarben, am Ende des oberen Schnabels geflammt
Augen	Dunkelbraun
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Hornfarben



Zeisig männlich (Carduelis spinus)
~ Mutation doppelt verdünnt ~

Größe : 11 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Scheitel, Hinterkopf	Hellbraun mit sehr hellgrauen Streifen
Augenbrauenstreifen	Hellgelb
Wange	Hellbraun grau, leicht gestreift
Kehle, Brust	Hellgrau. Brust leicht graubraun gestreift
Rücken	Brauner schulterlanger grauer Mantel ohne Streifen
Flanken	Hellbraun, mit grau braun gestreift
Bürzel	Gelb, gestreift mit grau braun
Schwanz	Erste zwei Drittel gelb und letzte Drittel hellgrau, äußere Federkiele gelblich. Graue Mittelfeder.
Flügeldecken	Klein : graubraun. Durchschnitt grünlich grau mit intensiv gelb gesäumt . Groß : grünlich grau gesäumt intensiv gelb.
Gefieder	Sekundär : hellgrau mit hellgelbem Federkiel mit gelbem Flügel. Primär : hellgrau mit hellgelben äußeren Federkiel. Kein Spiegel.
Schnabel	Fleischfarben geflammt an der Schnabelspitze
Augen	Dunkelbraun
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Hornfarben

Photo Philippe ROCHER



Zeisig männlich (Carduelis spinus)
~ Mutation Achat (verdünnt) ~

Größe : 11 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Scheitel, Hinterkopf, Kopf	Dunkelgrau. Schatten der Farbe in der gestrichelten grauen Mütze.
Augenbrauenstreifen	Gelb
Wange, Ohrenbereich	Grün grau verwaschen
Kehle	Dunkelgrauer Latz, falls vorhanden
Brust, Flanken	Gelblich grün. Flanken dunkelgrau gestreift.
Rücken	Grünlicher Mantel, diesig grau mit schwarzen Streifen
Bürzel	Grünlich
Schwanz	Erste zwei Drittel gelb und dunkelgrau am Ende. Mittlere Feder ganz dunkelgrau.
Gefieder	Groß : dunkelgrau mit gelben Außenkanten. Seite mit grauer Paspel. Flügel und Spiegel gelb.
Schnabel	Fleischfarben geflammt
Augen	Schwarz
Ständer	Dunkel fleischfarben
Krallen	Dunkel



Zeisig weiblich (Carduelis spinus)
~ Mutation Achat (verdünnt)~

Größe : 11 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Scheitel, Hinterkopf, Kopf	Hellgrau mit schwarzen Streifen
Augenbrauenstreifen	Hellgrau
Wange, Ohrenbereich	Gräulich
Brust	Hellgrau gestreift, schwarz verdünnt
Rücken	Grauer Mantel, verdünnt schwarz
Flanken	Hellgrau mit dunklem grau
Bürzel	Etwas dunkelgrau gestreift
Schwanz	Erste Drittel gelb und letzte zwei Drittel sehr dunkles grau. Dunkelgraue Mittelfeder
Gefieder	Groß: dunkelgrau mit gelben Außenkanten. Die Grenze der Sekundärteile gräulich. Flügel und Spiegel hellgelb.
Schnabel	Fleischfarben geflammt
Augen	Schwarz
Ständer	Dunkel fleischfarben
Krallen	Dunkel



Photo KBOF

Zeisig männlich (Carduelis spinus)
~ Mutation Achat (verdünnt) ~

Größe : 11 cm

Vererbung : Achat = geschlechtschromosomal rezessiv verwässert = autosomal dominant

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kappe	Dunkelgrau
Augenbrauenstreifen, Bürzel	Gelb
Wange	Gut grünlich gelb bis dunkelgrau gezogen. Leichte Verfärbungen rund um den Schnabel
Kehle	Lätzchen dunkelgrau, wenn vorhanden
Brust	Grünlich gelb diesig grau
Flanken	Gelblich, leichter als die Brust, mit dunkelgrauen Streifen
Rücken	Gelbgrün mit auffälligen dunkelgrauen Streifen
Schwanz	Oben : dunkelgrau. Unten : die ersten zwei Drittel gelb, am Ende dunkelgrau.
Gefieder	Groß : dunkelgrau mit gelbem Kiel Sekundär : dunkelgrau mit gelbem Kiel am Ende
Flügel	Dunkelgrau, auffällig gelbe Flügel
Schnabel	Fleischfarben geflammt
Augen	Schwarz
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Hornfarben



Photo Jean-Michel EYTORFF

Zeisig weiblich (Carduelis spinus)
~ Mutation Achat verdünnt ~

Größe : 11 cm

Vererbung : Achat = geschlechtschromosomal rezessiv verwässert = autosomal dominant

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kappe	Klar grünlich gelb mit dunkelgrauen Strichelungen
Wange	grünlich gelb verwaschen grau
Kehle	Gräulich
Brust	Hellgrau mit dunkelgrauen Streifen
Rücken	Blass gelblich grün mit dunkelgrauen sichtbaren Streifen im Rücken
Flanken	Grau, sehr klar, dunkelgrau gestreift
Bürzel	Gelblich
Schwanz	Oben : dunkelgrau. Unten : die ersten zwei Drittel gelb, am Ende dunkelgrau.
Gefieder	Groß : dunkelgrau mit gelbem Kiel. Sekundär : dunkelgrau mit gelbem Kiel am Ende
Decke	Dunkelgrau, gelbe Flügel
Schnabel	fleischfarben geflammt
Augen	Schwarz
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Hornfarben



Zeisig männlich (Carduelis spinus)
~ Mutation Isabell (braun verdünnt) ~

Größe : 11 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf, Hinterkopf	Hellbraun
Augenbrauenstreifen	Gelb
Wange	Hellbraun gelb verwaschen
Kehle, Brust	Gelb, Latz klar braun
Flanken	Gelblich mit hellbraunen Streifen, wenn sie existieren
Rücken	Mantel hellbraun, etwas gestreift
Bauch	Schmutzig weiß
Bürzel	Gelb
Schwanz	Erste zwei Drittel gelb und der Rest hellbraun. Mittelfeder ganz braun
Gefieder	Groß : hellbraun mit gelbem Kiel. Flügel und Spiegel gelb.
Flügeldecken	Klein : braun. Mittel : hellbraun mit gelbem Flügelband. Groß : hellbraun mit gelbem Kiel.
Schnabel	Fleischfarben, braun geflammt am oberen Schnabel
Augen	Braun
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Fleischfarben

PhotoFOI



Zeisig weiblich (Carduelis spinus)
 ~ *Mutation Isabell (braun verdünnt)*~

Größe : 11 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf, Scheitel, Rücken	Schmutzig weiß verwaschen und gelb mit hellbraun gestreift.
Augenbrauenstreifen	Hellgelb unauffällig
Wange	Gelb mit hellbraun gestreift
Kehle	Schmutzig weiß
Brust	Schmutzig weiß verwaschen, hellgelb mit hellbraunen Streifen auf der oberen Brust
Flanken	Schmutzig weiß mit hellbraun gestreift
Bauch	Schmutzig weiß
Bürzel	Schmutzig gelb verwaschen
Schwanz	Erste Drittel gelb und letzte zwei Drittel hellbraun. Mittelfeder braun
Flügel	Identisch mit den Flügeln der Männchen, aber weniger intensiv gelb
Schnabel	Fleischfarben, braun geflammt am oberen Schnabel
Augen	Braun
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Fleischfarben



Photo KBOF

Zeisig männlich (Carduelis spinus)
~ Mutation Isabell (braun verdünnt) ~

Größe : 11 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf, Wange	Gelb, verschleiert beige
Augenbrauenstreifen	Gelb unauffällig
Kehle, Brust, Rücken, Bürzel	Gelb, verschleiert beige. Streifenfrei
Flanken	Gelb beige gestreift
Bauch	Schmutzig weiß
Schwanz	Erste zwei Drittel gelb, der Rest ist hellbeige. Mittelfeder ganz gelb
Gefieder	Hellbeige mit gelben Kiel
Flügeldecken	Gelb mit hellbeige. Flügel sichtbar
Schnabel	Fleischfarben, braun geflammt an der Spitze des oberen Schnabels
Augen	Braun
Ständer	Fleischfarben
Krallen	fleischfarben



Photo Jean-Michel EYTORFF

Zeisig weiblich (Carduelis spinus)
 ~ *Mutation Isabell (braun verdünnt)* ~

Größe : 11 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf, Scheitel	Beige verwaschen gelb
Augenbrauenstreifen	Hellgelb
Kehle, Brust	Schmutzig weiß mit weniger gelb möglich
Rücken	verwaschen und leicht gelb beige gestreifter Mantel
Flanken	Schmutzig weiß mit hellbeige gestreift
Bauch	Schmutzig weiß
Bürzel	Hellgelb beige
Schwanz	Erste und letzte Drittel gelb beige. Mittelfeder ganz beige
Decken	Gelb und beige am Ende
Gefieder	Beige mit gelbem Kiel
Schnabel	Fleischfarben, braun geflammt an der Spitze des oberen Schnabels
Augen	Braun
Ständer	fleischfarben
Krallen	fleischfarben



Photo Jean-Michel EYTORFF

Zeisig männlich (Carduelis spinus)
~ Mutation ivore ~

Größe : 11 cm

Photo A. Van Mingeroet

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf, Scheitel, Kappe	Schwarz, etwas gepunktete graue Kappe
Wange, Ohrenbereich	Gelb gräulich elfenbeinfarben verzogen
Augenbrauenstreifen	Gelb elfenbein hinter dem Auge und am Hals
Nacken, Rücken	Grünlich grauer Hals mit sehr feinen dunklen Streifen
Kehle, Brust, Schulter	Grau-grünlich. Einige männliche Exemplare haben eine kleine schwarze regelmäßige Bartzeichnung unterhalb des Schnabels.
Flanken	Graugrün mit sehr regelmäßigen schwarzen Streifen. Deutliche Farbe an der Rückseite der Flanke
Bauch	Analbereich leicht gräulich
Bürzel	Graugrün
Schwanz	Erste zwei Drittel elfenbeinfarben, gelbe Feder mit schwarzer Spitze. Zwei schwarze mittlere Schwanzfedern
Gefieder	Große schwarze Federn mit bräunlichen äußeren Federkielen. Flügel und kleiner gelb elfenbeinfarbener Spiegel.
Schnabel	Lichtfarbener Schnabel, Oberseite schwarz geflammt
Augen	Hellbraun
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Schwarz



Zeisig weiblich (Carduelis spinus)
~ Mutation ivore ~

Größe : 11 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf, Scheitel	Grau mit feinen Streifen
Wange, Ohrenbereich	Bräunlich gelb verschleiert mit elfenbein
Augenbrauenstreifen	Viel weniger gelb als das Männchen, eher graubraun
Nacken, Rücken, Schulter	Fein grau bräunlich schwarz gestreift
Kehle, Brust, Flanken	Gräulich als Ganzes. Seiten der Brust und an den Seiten mit einer schönen glatten dunkelgrauen quergestreiften Zeichnung
Bauch	Gräulich
Bürzel	Etwas grau grün dunkelgrau gestreift
Schwanz	Erstes Drittel gelb elfenbeinfarbene Federn, Rest dunkelgrau. Zwei mittlere grau schwarze Schwanzfedern mit skalierten Zeichnungen.
Flügel	Dunkle Marken, das Männliche grau
Schnabel	Lichtfarbener Schnabel, Oberseite schwarz geflammt
Augen	Hellbraun
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Schwarz



Photo Bernard CORMELIAU

Zeisig männlich (Carduelis spinus)
~ Mutation Achat ivore ~

Größe : 11 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf, Scheitel, Kappe	Dunkelgrau, punktierte graue Kappe
Wange, Ohrenbereich	Grün verwaschen grau
Augenbrauenstreifen	Gelb elfenbein
Rücken	Grünlicher Mantel diesig grau mit schwarzen Streifen
Kehle, Brust, Flanken	Grünlich gelb elfenbein. Flanken dunkelgraue Streifen. Kehle manchmal mit dunkelgrauem Lätzchen
Bürzel	Grünlich
Schwanz	Erste zwei Drittel gelbe Federn und dunkelgrau am Ende. Mittlere Federn völlig dunkelgrau
Flügel	Große dunkle Außenkanten, graue Federn, Kanten gelb elfenbein. Flügel gelb und Spiegel hell elfenbeinfarben. Sekundär mit grauem Kiel
Schnabel	Fleischfarben geflammt
Augen	Schwarz
Ständer	fleischfarben
Krallen	Dunkel



Photo Jean-Michel EYTORFF

Zeisig weiblich (Carduelis spinus)
~ Mutation Achat ivore ~

Größe : 11 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf, Scheitel, Kappe	Hellgrau mit schwarzen Streifen
Wange, Ohrenbereich	Gräulich
Augenbrauenstreifen	Hellgrau
Rücken	Mantel grau gestreift schwarz verdünnt
Brust	Hellgrau gestreift schwarz verdünnt
Flanken	Hellgrau mit dunkelgrauen Streifen
Bürzel	Grau, leicht mit dunklem grau ausgestrichen
Schwanz	Erstes Drittel mit gelb elfenbeinfarbenen Federn und der Rest ist dunkelgrau. Zwei sehr dunkle Mittelfedern
Flügel	Große dunkle Außenkanten, graue Federn-Kanten gelb elfenbein. Flügel gelb und Spiegel hell elfenbeinfarben. Sekundär mit grauen Kiel
Schnabel	Fleischfarben geflammt
Augen	Schwarz
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Dunkel




Birkenzeisig


Carduelis flammea cabaret
1. Jahr




Carduelis flammea cabaret
adult



Carduelis flammea flammea
1. Jahr



Carduelis flammea flammea
adult



Standard COM/OMJ

Birkenzeisig (*Carduelis flammea cabaret*)
 ~ *Phénotype wildfarben* ~

Größe : 11.5 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Bräunlich. Die Hälfte des Scheitels ist karminrot oder gelbbraun.
Wange, Ohrenbereich	Dunkelbraun. Zeichnung Halbmond
Augenbrauenstreifen	Leicht bräunlich. Klein und regelmäßig über den Augen und um den Hals
Nacken, Rücken, Schulter	Braun mit dunkelbraunen Streifen, eng und regelmäßig
Kehle	Warmes braun. Kleiner dunkelbrauner Latz
Brust	Oben und Seiten karminrosa, manchmal warmes braun
Flanken, Bauch	Schmutzig weiß. Flanken regelmäßig feine dunkelbraune Querstreifen, die nach oben zu den Schultern reichen
Flügel, Schwanz	Dunkelbraun mit weißen Säumungen und braun-weißem Flügelspiegel
Bürzel	verwaschen karminrot oder braunpink mit dunkelbraunen Streifen
Schnabel	Fein und scharf. Schnabel bräunlich-gelb
Augen	Dunkelbraun
Ständer	Dunkelbraun
Krallen	Schwarz



Birkenzeisig geflammt (Carduelis flammea flammea)
~ Phénotype wildfarben ~

Unterschiede mit dem Birkenzeisig Kabarett :

- Größere Größe (13 - 15 cm) ??
- Farbe blasser Hintergrund, braun beige
- Etwas hellere braune Streifen
- Klare und sichtbare Flügel
- Klare Stelle auf dem Rücken (Merkmale der Spezies)



Photo UOF



Birkenzeisig *Mutation braun*

Größe : 12 - 15 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Braun beige. Scheitel rosarot
Wange, Ohrenbereich	Braun
Augenbrauenstreifen	Beige
Rücken	Warmes braun mit engen regelmäßigen dunkelbraunen Streifen
Kehle	Braun mit einem dunkelbraunen Latz
Brust, Flanken	Hellbraun. Warme braune Streifen auf der Brust und Schultern. Männliche Ausgewachsene können braunpinke Brust haben.
Bauch	Schmutzig weiß
Flügel, Schwanz	Großes Gefieder braune Federn mit beige Kiel.
Bürzel	Braun gestreift, braun und pink verwaschen
Schnabel	Fein und scharf. Schnabel bräunlich gelb
Ständer	Fleischfarben
Augen, Krallen	Dunkelbraun



Photo FOF



Photo UOF

Geschlechtsunterschiede: Farben und Marken identisch. Weibchen abgesehen von der Brust etwas leichtere Flanken. Kein Rot auf der Brust und Hinterteil.

Birkenzeisig ~ *Mutation Pastell (ex-Achat)* ~

Größe : 12 - 15 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Grau beige. Die Hälfte ist rot manchmal gelb, braun, rosa
Wange, Ohrenbereich	Grau braun rose verwaschen. Zeichnung Halbmond
Augenbrauenstreifen	Grau beige. Klein und regelmäßig am Nacken
Rücken, Nacken, Schulter	Hellgrau mit dunkelgrauen regelmäßigen Streifen
Kehle	Hellgrau mit kleinem dunkelgrauen Latz
Brust	Hellgrau, manchmal mit grauen Streifen an der Spitze
Flanken	Hellgrau mit grauen regulären Streifen an der Brust und über den Flügeln
Bauch	Schmutzig weiß
Flügel, Schwanz	Großes dunkelgraues Gefieder und Federn mit hellgrauer Ränderung
Bürzel	Hellgrau mit dunkelgrau gestreift
Schnabel	Gelblich geflammter Schnabel
Augen	Schwarz
Ständer	Gräulich
Krallen	Schwarz



Photo Bernard COMELIAU



Photo FOI

Birkenzeisig
 ~ *Mutation braun pastell (ex-Isabell)* ~

Größe : 12 - 15 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Beige. Die Hälfte ist rot oder manchmal gelb, braun, rosa
Wange, Ohrenbereich	verwaschen beige rosa.
Augenbrauenstreifen	Beige
Rücken	Hellbeige mit hellbraunen Streifen
Kehle	Hellbeige mit kleinem hellbraunem Latz
Brust	Hellbeige, manchmal rose mit hellbraunen Streifen an der Spitze
Flanken	Hellbeige gestreift mit hellbraunen Spitzen an der Brust und den Flügeln
Bauch	Schmutzig weiß
Flügel	Primäres Gefieder beige. Gefieder klar braun. Hellbraune Flügel mit hellbeige
Schwanz	Beige Feder mit heller sichtbarer Umrandung
Bürzel	Beige hellbraun gestreift, manchmal rosa verwaschen
Schnabel	Gelblich geflammter Oberschnabel
Augen	Dunkelbraun
Ständer, Krallen	Fleischfarben

Photo Philippe ROCHER



Birkenzeisig
~ *Mutation pastel (ex- Pastell)*

Größe : 12 - 15 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Braun mit dunkelbraun gestreift
Wange	Braun mit dunkelbraunem Ohrenbereich
Rücken, Flanken	Braun dunkelbraun gestreift
Kehle	Kleiner grauer Latz
Brust	Warmes braun
Flügel, Schwanz	Primäre und sekundäre dunkelbraune Schwungfedern mit beigem Kiel. Beige braune Flügel
Schwanz	Braun mit beigem Rand
Bürzel	Beige dunkelbraun gestreift
Schnabel	Gelb mit brauner Spitze
Augen	Schwarz
Ständer	Dunkel fleischfarben
Krallen	Schwarz



Photo Drigsmans

Birkenzeisig
~ *Mutation braun pastell (ex-braun pastell)*~

Größe : 12 - 15 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Hellbraun mit roter Kappe
Wange	Braun
Hals	Braun mit mehr hellbraunen Streifen
Rücken	Braun mit mehr braunen Streifen
Kehle	Grauer Latz
Brust	Braun ohne sichtbaren Streifen
Flanken	Braun mit leicht sichtbaren Streifen
Bauch	Schmutzig weiß
Flügel	Primäres Gefieder beige mit hellbraunen Nadelstreifen. Sekundäre graue und beige Abdeckungen mit sehr sichtbaren braunen Nadelstreifen
Schwanz, Bürzel	Beige mit braunen Rändern
Schnabel	Gelb
Augen	Schwarzbraun
Ständer, Krallen	fleischfarben



Photo KBOF

Birkenzeisig
~ Mutation dunkel ~

Größe : 12 - 15 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Dunkelbraun mit roter Kappe
Augenbrauenstreifen	Braun leicht sichtbar
Wange	Braun, sehr dunkel
Hals	Hellbraun mit braunen Streifen
Bereich zwischen Schnabel und Auge	Schwarz
Nacken, Rücken, Schulter	Dunkelbraun mit schmalen regelmäßigen schwarzbraunen Streifen
Kehle	Dunkelbraun mit schwarzem Latz
Brust	Dunkelbraun mit schwarzen Streifen an den Seiten und einer skalierten schwarzbraunen Zeichnung in der Mitte
Flanken	Sehr dunkle Hintergrundfarbe, feine regelmäßige dunkelbraune Streifen zu den Schultern und entlang den Flanken
Bauch	Schmutzig weiß trüb braun
Flügel	Primäres Gefieder sehr dunkelbraun mit hellem Rand und braunen Flügeldecken
Schwanz, Bürzel	Sehr dunkelbraun. Schwarzbraun gestreiftes Hinterteil. Federn mit braunem Rand
Schnabel	Dunkel und an der Unterseite gelblich
Augen, Ständer, Krallen	schwarz



Photo Philippe ROCHER

Birkenzeisig
 ~ *Mutation pastell dunkel (ex-achat dunkel)* ~

Größe : 12 - 15 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf, Augenbrauenstreifen	Graubeige. Halbrosa oder gelbbraun roter Scheitel. Schmale graue Augenbrauen
Wange, Ohrenbereich	Graue Wangen rosa verwaschen, Zeichnung Halbmond
Bereich zwischen Schnabel und Auge	Gräulich
Rücken, Schulter, Nacken, Bürzel	Dunkle Streifen mit regelmäßigen grauen Streifen. Streifen durchsetzen Rücken, Nacken und Schultern
Kehle	Dunkel mit einem kleinen dunkelgrauen Latz
Brust	Dunkelgraue Streifen auf der oberen grauen Brust. Können bei erwachsenen Tieren rosa sein.
Flanken	Dunkel und regelmäßig grau gestreift. Streifen verlassen die obere Brust und über die Flügel
Bauch	Schmutzig weiß
Flügel	Großes dunkles Gefieder, hellgrau am Ende. Dunkelgraue Flügeldecken
Schwanz	Dunkelgraues Gefieder, dunkelgrau an der Spitze
Schnabel	Gelblich geflammter Oberschnabel
Ständer	Gräulich
Augen, Krallen	Schwarz



Photo KBOF

Birkenzeisig ~ *Mutation dunkelbraun* ~

Größe : 12 - 15 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Braun mit dunkelrotem Scheitel
Wange, Ohrenbereich	Dunkelbraun
Bereich zwischen Schnabel und Auge	
Rücken	Dunkelbraun mit leichter Rückenzeichnung
Kehle	Dunkel mit einem großen dunkelbraunem Latz
Brust	Dunkelbraun mit sichtbarem Streifen auf der oberen Brust
Flanken	Braun gestreift mit feinen dunkelbraunen Streifen an den Schultern
Bauch	Braunbeige
Flügel	Großes dunkelbraunes Gefieder mit einem sehr kleinen beige Rand. Flügel nahezu unsichtbar.
Schwanz	Dunkelbraun gestreift
Bürzel	Dunkel mit einem sehr kleinen beige Rand. Braune Federn
Schnabel	Gelbbraun geflammt
Ständer, Krallen	Braun
Augen	Dunkelbraun



Photo Drizmans

Birkenzeisig
~ Mutation phaéo ~

Größe : 12 - 15 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Hellbraun ohne rote oder orangefarbene Kappe
Hals	Weiß mit braun gestreift
Rücken	Weißlich braun geschuppt
Kehle, Bauch	Weißlich
Brust	Weißlich mit braunen Schuppen an der Spitze
Flanken	Weißlich braun geschuppt
Flügel	Weißer Schwungfedern mit hellbrauner Außenkante. Sekundär weiß mit einem breiteren braunen Rand. Schulterfedern weißlich mit braunen Schuppen
Schwanz	Weiß mit großen braunen Nadelstreifen
Bürzel	Weißer Federn mit einem braunen Rand
Schnabel	Gelb bis weißlich (wie um die Augen und Latz)
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Hornfarben
Augen	Rot



Birkenzeisig weißlich (Carduelis hornemanni)
~ Phénotype wildfarben ~

Größe: 14 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Schnabel	Kurzer konischer Schnabel, gelblich. Der obere Schnabel ist dunkler als der untere Schnabel
Augen	Schwarz
Kopf	Rund, in den Schultern eingebettet. Bereich zwischen Schnabel und Augen schwarz-braun. Karminrot-rosa Kappe auf Stirn. Grau-brauner Lidstrich, gekrönt von einer dünnen grau-beige Augenbraue. Rückseite des Kopfes und Hals beige-grau mit schwarzen Streifen. Wenig ausgeprägte Wangen
Rücken	Grau-beige markiert, regelmäßige schwarzbraune Streifen mit einem helleren Bereich in der Mitte
Kehle	Kleiner Latz, schwarzbraunes Kinn. Weißliche Kehle, kann manchmal sehr hellrosa reflektieren
Brust	Wie weißliche Kehle, auch leicht rosa
Flanken	Sehr leicht beige-grau mit schwarzbraun gestreift
Bauch	Weiß
Flügel	Große Federn = schwärzlich, fein hellbraun geleitet Sekundär = schwärzlich, mit einem breiteren grau-beige Rand Mantel /Decke = schwärzlich, eingefasst mit schmutzig-weißen Flügeln
Schwanz	Weiß, leicht gestreift oder verwaschen, rosa akzeptiert
Bürzel	Federn = schwärzlich, bekleidet mit grau-beige Rand
Ständer	Braun-schwarz
Krallen	Schwarz
Allgemeine Form	Ganz rund, elegante Kniebeugen



Stieglitz

(*Carduelis carduelis carduelis*)

Mann



Frau



Stieglitz (major)

(*Carduelis carduelis major*)



Größe 14/16 cm

- Marke weiß mit großem Hals
- Wange, Kehle, weiß
- Kragen mit großem Helm, sehr dunkle Umgehung der Kragenrückseite
- Zeichnung intensive Brust und häufig Zeichen schwärzlich und gelb.
Die Grenzen der Maske sind groß und ordentlich
- Flanken gut markiert,
- Weißbürzel beige verwaschen.

Stieglitz (britannica)

(*Carduelis carduelis britanica*)



Größe : 12/ 12,5 cm

- Marke schmaler Hals, schmutzig weiß,
- Hals und Wangen, stark beige verwaschen,
- Wangen und Bauch weiß und glanzlos,
- Flanken und Brustzeichnung braun,
- Dunkelbrauner Mantel,
- Schmutzig weißer Bürzel, stark verwaschen mit braun.

Stieglitz (parva)

(*Carduelis carduelis parva*)



Größe 10,5/11 cm

- Marke weiß, enghalsig,
- Wangen, Kehle und weißer Bauch,
- Brustmuskulatur und Flankenzeichnung,
- Weißbürzel verwaschen beige,
- Langer Schnabel, stark und scharf, der manchmal in keinem Verhältnis zur Größe des Vogels steht.

Stieglitz (tschusii)

(*Carduelis carduelis tschusii*)



Größe 11 cm,

- Marke Hals fast nicht existent,
- Wangen verwaschen braun,
- Wangen und weißer Bauch,
- Brustmuskulatur, Flanken und Zeichnung,
- Dunkelbrauner Mantel,
- Weißbürzel beige verwaschen,
- Langer Schnabel, stark und scharf (kürzer als parva).

Stieglitz (*Carduelis carduelis*)

~ *Phénotype wildfarben* ~

Größe : 11 – 16 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Scharlachrote Maske, die über die Stirn, Kinn und Wangen und über die Hälfte der Augen reichen. Hinter der Maske, große rweiße Fleck (manchmal braun als Unterarten) an den Seiten des Kopfes und des Halses.
Hals	Weißer Kragen zwischen dem schwarz-braunen Hals
Rücken	dunkelbraun
Kappe, Nacken, Flügel, Bereich zwischen Schnabel und Auge	schwarz. Große leuchtend gelbe Flügel. Weiß an den Enden der einzelnen Flügel
Brust	Braun, Zeichnung auf der Brust wie ein weißer Pilz
Flanken	Bräunlich blass zum Bauch hin
Bauch	Weiß
Bürzel	Weißlich
Schwanz	Schwarz. Große weiße Punkte auf unterem Teil der äußeren schwarzen Schwanzfedern
Augen	Dunkelbraun
Ständer	Fleischfarben, schwarzer konischer Auslauf
Krallen	dunkel



Photos Philippe ROCHER

Geschlechtsunterschiede : in der weiblichen Abdeckung bräunlich durchzogen und nicht schwarz wie bei männlichen

Stieglitz~ Mutation braun ~

Größe : 11 – 16 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Orangerot Maske, die über die Stirn, Kinn, Wangen und die Hälfte der Augen reichen. Hinter der Maske, großer weißer Fleck (manchmal braun als Unterarten) an den Seiten des Kopfes und der Halses.
Kappe, Nacken, Bereich zwischen Schnabel und Augen	Dunkelbraun
Hals	Weißer Kragen um den Hals, braun
Rücken	Warmes braunes Gefieder
Brust	Warmes braun, Zeichnung wie ein weißer Pilz
Flanken	Braun, nach hinten heller
Bauch	Schmutzig weiß
Flügel	Dunkle Flügel mit äußeren hell-gelben Federn. Weiß an den Enden der einzelnen Federn
Schwanz	Weiß verwaschen braun
Bürzel	Dunkelbraun, mit weißen Federn am Ende der gepunkteten Linie. Große weiße Flecken auf dem unteren Teil der äußeren Schwanzfedern
Augen	Dunkelbraun
Ständer, Krallen, Schnabel	Fleischfarben

Photo UOF



Geschlechtsunterschiede in der weiblichen Abdeckung bräunlich durchzogen und nicht schwarz wie bei männlichen

Stieglitz~ Mutation Achat ~

Größe : 11 – 16 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Scharlachrote Maske. Hinter der Maske große weiße Flecken an den Seiten des Kopfes und am Hals
Kappe Nacken Schultern Bereich zwischen Schnabel und Augen	Schwarz
Hals	Weißer Kragen um den Hals, schwarz beige grauer Mantel
Rücken	Grau beige Gefieder
Brust	Beige Grau, Zeichnung wie ein weißer Pilz
Flanken	Grau beige, nach hinten heller
Bauch	Schmutzig weiß
Flügel	Schwarz mit breiten hellen gelben Flügeln. Weiß an den Enden der einzelnen Federn.
Bürzel	Weiß verwaschen beige grau
Schwanz	Schwarz mit weißen Federn am Ende der gepunkteten Linie. Große weiße Flecken auf dem unteren Teil der äußeren Schwanzfedern.
Augen	Dunkelbraun
Ständer, Schnabel	Fleischfarben, Ende geflammt am schwarzen Schnabel.
Krallen	Dunkel



Photo UOF

Geschlechtsunterschiede in der weiblichen Abdeckung bräunlich durchzogen und nicht schwarz wie bei männlichen

Standard COM/OMJ

Stieglitz ~ Mutation pastell ~

Größe : 11 – 16 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Orange rote Maske mit grauem Muster auf dem Kopf und am Hals.
Wange	Schmutzig weiß
Hals	Schmutziges Weiß unter der Maske.
Rücken, Flanken	Hellbraun grau
Brust	Hellbraun grau mit weiß in der Mitte
Flügel	Primär- und Sekundärschwungfedern dunkelgrau möglichst gleich mit weißen Spitzen. Gelber Spiegel
Decken	Dunkelgrau
Bürzel	Hellbraun grau, Ende in schmutzig weißer Richtung zum Schwanz.
Schwanz	Graue Federn mit weißen Flecken auf den beiden äußeren Schwanzfedern
Augen	Schwarz
Ständer, Krallen, Schnabel	Fleischfarben



Stieglitz ~ Mutation Isabell ~

Größe : 11 – 16 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Orangerote Maske (Stirn, Kinn, Wangen und bis zur Hälfte des Auges). Hinter der Maske ein großer weißer Fleck (manchmal braun als Unterarten) an den Seiten des Kopfes und des Halses.
Kappe, Nacken, Bereich zwischen Schnabel und Augen	Braun beige
Hals	Weißer Kragen bildet eine Trennung zwischen beige braunem Hals und beige braunen Mantel.
Rücken, Flanken	Braun beige, die Seiten sind heller
Schulter	Braun
Brust	Braun beige, Zeichnung wie weißem Pilz in der Mitte
Bauch	Schmutzig weiß
Flügel	Braun beige mit breiten hellen gelben Flügel. Weiß an den Enden der einzelnen Federn
Bürzel	Weiß verwaschen grau
Schwanz	Braun beige, übersät mit weißen Stellen an den Spitzen der Federn. Große weiße Flecken auf dem unteren Teil der äußeren Schwanzfedern.
Augen	Braun
Ständer, Krallen, Schnabel	Fleischfarben



Geschlechtsunterschiede : in der weiblichen Abdeckung bräunlich durchzogen und nicht schwarz wie bei männlichen

Standard COM/OMJ

Stieglitz ~ Mutation Satinet ~

Größe : 11 – 16 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Orangerote Maske (Stirn, Kinn, Wangen und bis zur Hälfte des Auges). Hinter der Maske ein großer weißer Fleck (manchmal braun als Unterarten) an den Seiten des Kopfes und des Halses.
Kappe, Nacken, Bereich zwischen Schnabel und Augen	Beige
Nacken, Hals	Weißer Kragen bildet eine Trennung zwischen beige braunem Hals und beige braunen Mantel.
Rücken	Weiß beige verschleiert
Schulter	Beige
Brust	Schmutziges Weiß, mit beigefarbener Pilzzeichnung, sichtbar verschleiert
Flanken	Schmutzig weiß leicht trübe beige
Bauch	Schmutzig weiß
Flügel	Beige, mit breiten hellen gelben Flügeln. Weiß an den Enden der einzelnen Federn
Bürzel	Weiß verwaschen beige
Schwanz	Beige, übersät mit weißen Stellen an den Spitzen der Federn. Große weiße Flecken auf dem unteren Teil der äußeren Schwanzfedern.
Augen	Rot
Ständer, Krallen, Schnabel	Fleischfarben



Stieglitz ~ Mutation weiß mit orangefarbener Maske ~

Größe : 11 – 16 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Weiß. Orange-Maske, die sich nicht auf der Basis des Schnabels erstreckt.
Rücken	Weiß
Brust	Weiß
Flanken	Weiß
Gefieder	Primär: Schwungfedern weiß mit einem gelben Rand im mittleren Teil. Sekundär : weiß
Decken	Primär: Schwanzdecken weiß mit einigen gelben Federn.
Bürzel	Weiß
Schwanz	Weiß mit einem hellgelben Rand
Schnabel	Fleischfarben, leicht geflammt am Ende des Oberschnabels
Augen	Schwarz
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Weiß



Photo KBOF

Stieglitz ~ Mutation weißer Kopf ~

Größe : 11 – 16 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe	
Kopf	Keine schwarze Kappe, wird durch eine möglichst gleichmäßige weiße Kappe ersetzt. (Auf jeder Seite des Kopfes existieren nur Spuren dreieckig und rot oder orange.)	
Maske	Leuchtend rote Maske, die auf dem Gesicht und Stirn verlängert werden kann	
Nacken, Hals	Gleiche Eigenschaften wie der Wildtyp, mit Außenspiegeln, die sich zu großen Decken erstrecken und zurück in den Schoß der Schulter gehen (es ist auch auf der Unterseite des Flügels sichtbar).	
Rücken		
Schulter		
Brust		
Flanken		
Bauch		
Flügel		
Bürzel		Diese autosomal-rezessive Mutation ist zu anderen bestehenden Mutationen (braun, Achat, etc.) umgesetzt worden.
Schwanz		
Augen		
Ständer, Krallen, Schnabel		



Stieglitz ~ Mutation gelb ~

Größe : 11 – 16 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	<p>Das ganze Gefieder hat eine gelbe Färbung, vor allem auf das Fehlen von Melanin-Pigment Teile, Wangen, Hals, Brust, Hinterteil sichtbar.</p> <p>Die gelbe Farbe sollte rein, intensiv, so einheitlich wie möglich sein.</p> <p>Gesichtsmaske ist sehr hell, größer und diffuser als bei Arten, die mit dem klassischen Muster.</p> <p>Diese Mutation dominant vererbt wurde auf alle vorhandenen Sorten umgesetzt.</p>
Kappe, Nacken, Bereich zwischen Schnabel und Augen	
Nacken, Hals	
Rücken	
Schulter	
Brust	
Flanken	
Bauch	
Flügel	
Bürzel	
Schwanz	
Augen	
Ständer, Krallen, Schnabel	



Stieglitz Mutation aminet


(früher fälschlich : Eumo)

Größe : 11 – 16 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Scharlachrote Maske (Stirn, Kinn, Wangen und bis zur Hälfte des Auges). Hinter der Maske ein großer weißer Fleck (manchmal braun als Unterarten) an den Seiten des Kopfes und des Halses.
Kappe, Nacken, Bereich zwischen Schnabel und Augen	dunkel möglich, weißer Hals.
Nacken, Hals	Weißer Kragen bildet eine Trennung zwischen dem schwarzen Hals und beige-rosa Mantel
Rücken	Beige-rosa
Schulter	Braun-schwarz gefleckt bei Männchen und hellbraun-braun bei Weibchen.
Brust	Gelblich beige Schleier, Pilzförmige Zeichnung ist fast unsichtbar
Flanken	Sehr hellbeige in weiß gehüllt
Bauch	Weiß
Flügel	Schwarze Federn mit breiten hellen gelben Flügeln. Weiß an den Enden der einzelnen Federn
Bürzel	So weiß wie möglich
Schwanz	Schwarz mit weißen Federn und an den Enden Punkte. Große weiße Flecken auf der Innenseite der äußeren Schwanzfedern
Augen	Dunkelbraun
Ständer, Krallen, Schnabel	Fleischfarben



Vergleich zwischen Achat und Aminet




Grünling (*Carduelis chloris chloris*)

Männlich



Weiblich



Grünling

(*Carduelis chloris aurantiventris*)

Größe 14 - 16 cm,



- Grün heller als in *Chloris chloris*
- Hals und Bauch stark verwaschen gelb
- Schnabel und Beine klarer als *Chloris chloris*
- größer und bunter als *Chloris chloris*



Grünling männlich (*Carduelis chloris chloris*)
 ~ *Phénotype wildfarben* ~

Größe : 13/15 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Groß, massiv, mit gut gefülltem Hals. Leuchtend grüne Front. Loraler Bereich Schnurrbart grau-grün
Wange	Graue Asche (überzogen)
Hals, Schulter	Gelblich-grün
Rücken	Olivgrün mit bräunlichen Reflexen.
Brust, Flanken	Olivgrün
Bauch	Weißlich grau
Flügel	Große bräunlich schwarze Federn mit hellen gelben äußeren Federkielen. Sekundär grau mit bräunlich-schwarzem Rand am Ende.
Schwanz	Gelb an der Basis und schwarzen Federn, bräunlich am Ende mit einem grauen Rand entlang der äußeren Federkiele. Die beiden mittleren Federn sind bräunlich schwarz. Kurzer Schwanz mit gegabeltem Ende.
Augen	Dunkelbraun
Schnabel	Fleischfarben, braun geflammt. Groß und konisch
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Dunkel fleischfarben



Photo UOF

Grünling weiblich (*Carduelis chloris chloris*)
~ Phénotype wildfarben ~

Größe : 13/15 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Graubraun, groß, massiv, mit gut gefülltem Hals
Wange	Graue Asche (grau überzogen)
Kehle, Schulter	Grau grün
Rücken	Graubraune Zeichnung, dunklere Streifen
Brust, Flanken	Graubraune Streifen
Bauch	Weißlich grau
Flügel	Große Federn bräunlich schwarz mit gelben äußeren Federkielen. Nebenfedern grau mit bräunlich schwarzem Rand an der Spitze. Schmäler als bei den männlichen.
Schwanz	Gelb an der Basis und schwarz bräunlichen Federn am Ende mit einem grauen Rand entlang der äußeren Federkiele. Die beiden mittleren Federn sind bräunlich schwarz. Kurzer Schwanz mit dem gegabelten Ende. Enger als der männliche Spiegel
Augen	Dunkelbraun
Schnabel	Fleischfarben, braun geflammt. Groß und konisch.
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Dunkel fleischfarben



Grünling männlich *~ Mutation Isabell ~*

Größe : 13/15 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Gelblich
Kappe, Wange, Bart	Beige
Kehle	Gelb
Rücken	Gelb mit hellbeigem Schleier
Brust, Flanken	Gelb mit beigem Schleier
Bauch	Gelb verblassen zu weiß in Richtung des Afters.
Flügel	Große hellbraune Federn mit gelben Federkielen. Außengrenze beige am Ende braun. Sekundär mit einem breiten beigen Rand.
Decken	Große beige Decken. Kleine und mittlere gelbe Abdeckungen.
Bürzel	Gelb
Schwanz	Das erste und das letzte Drittel ist gelb braun beige
Augen	Dunkelbraun
Schnabel	Fleischfarben
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Fleischfarben

Hinweis: Beiger Schleier ist bei erwachsenen Männern weniger sichtbar.



Grünling weiblich
~ Mutation Isabell ~

Größe : 13/15 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Gelblich
Kappe, Wange, Bart	Beige
Kehle	Gelblich-grün
Rücken	Gelblich-grün mit hellem beige Schleier
Brust, Flanken	Gelblich-grün mit einem beige Schleier.
Bauch	Hellbeige
Flügel	Große beige braunen Federn mit helleren Federkiele
Decken	Große braune beige Decken. Kleine und mittlere gelblich-grünen Decken verwaschen beige.
Bürzel	Gelblich-grün
Schwanz	Erste Drittel der Schwanzfedern hellbraun, dritte gelb mit beige Rändern am Ende bis auf die beiden mittleren Schwanzfedern, die nicht gelb sind.
Augen	Dunkelbraun
Schnabel	Fleischfarben
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Fleischfarben

Hinweis: Die gelbe Grundfarbe ist bei Erwachsenen mehr sichtbar.



Photo FOI

Grünling ~ *Mutation Achat* ~

Größe : 13/15 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Gelblich-grün
Kappe, Wangen, Bart	Grau
Kehle	Gelblich-grün
Rücken	Hellgrün mit sehr regelmäßigem grauen Schleier
Brust, Flanken	Gelblich-grün mit einem grauen Schleier
Bauch	Gelblich-grün
Flügel	Federkiele mit großen dunkelgelben und hellgrauen Außengrenzen, an der Stirn graue Federn. Sekundär dunkelgrau mit einer breiten hellgrauen Grenze.
Decke	Große Decke silbergrau bedeckt, kleine und mittlere gelblich-grün.
Bürzel	Gelblich-grün
Schwanz	Die ersten zwei Drittel gelb und dunkelgrau, das letzte Drittel Federn klar bis auf die beiden mittleren Schwanzfedern, die keinen gelben grauen Rand haben
Augen	Schwarz
Schnabel	Fleischfarben
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Fleischfarben



Photo UOF

Hinweis: Der graue Schleier ist bei erwachsenen Männern weniger sichtbar.

Grünling weiblich ~ *Mutation Achat* ~

Größe : 13/15 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Gelblich-grüne Kappe mit grauen Strichelungen. Wangen gelblich-grün verwaschen grau. Graue Schnurrbärte.
Kehle	Hellgrau
Rücken	Grün mit grauem Streifenmuster deutlich sichtbar
Brust, Flanken	Hellgrau. Brust gestreift mit grauem Muster an den Seiten
Bauch	Hellgrau
Flügel	Große dunkle graue Federn und lichtgraue Federkiele, am Ende gelb. Sekundär grau dunkelgrau braun mit einem breiten Rand.
Decken	Große Federn braun grau abgedeckt. Kleine und mittlere Federn verwaschen grüngrau.
Bürzel	Gelblich-grün diesig grau
Schwanz	Die ersten zwei Drittel hell und das letzte Drittel dunkelgrau, gelbe Federn hell am Ende bis auf die beiden mittleren Schwanzfedern, die keinen gelb grauen Rand haben
Augen	Schwarz
Schnabel	Fleischfarben
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Fleischfarben

Photo KBOF



Hinweis: die gelbe Grundfarbe ist bei Erwachsenen mehr sichtbar.

Grünling männlich ~ Mutation braun ~

Größe : 13/15 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Gelblich-braun mit braun-grauem Schleier auf den Wangen. Bart dunkler als die Wangen. Augenbrauen klarer
Rücken	Gelblich braun
Brust	Gelb braun
Flanken	Gelblich braun
Bauch	Gelblich
Flügel	Große braune Federn mit gelben Federkielen. Außengrenze und am Ende beige. Sekundär graubraun
Decken	Große graubraune Federn, kleine und mittlere gelblich-braun
Bürzel	Oliv
Schwanz	Zwei Drittel gelb-braun beige, die beiden mittleren Federn sind nicht gelb
Augen	Braun.
Schnabel	Fleischfarben
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Fleischfarben

Photo Philippe ROCHER



Hinweis: Erwachsene Männchen haben eine gelbe Hintergrundfarbe, auf der Brust sichtbar.

Grünling weiblich
~ Mutation braun ~

Größe : 13/15 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Warmes braun mit sichtbarem Bart
Kehle	Gelblich-braun
Rücken	warmes braun
Brust	Braun
Flanken	Warmes braun
Bauch	Schmutzig weiß
Flügel	Große braune Federn mit kleinen externen Federkielen, gelb und beige am Ende. Sekundär braun mit einem grauen Schleier
Decken	Große braune Federn, bedeckt mit einem grauen Schleier. Kleine und mittlere warme braune Decken
Bürzel	Gelblich-braun
Schwanz	Erstes und letztes Drittel gelb braun beige, die zwei mittleren Federn sind nicht gelb.
Augen	Braun
Schnabel	Fleischfarben
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Fleischfarben

Photo UOF



Grünling männlich ~ *Mutation Satinet* ~

Größe : 13/15 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Gelb
Kappe, Wange	Sehr hellbeige
Kehle, Bürzel	Gelb
Rücken	Gelb mit einem sehr hellen beige Schleier, ohne Farbstreifen
Brust	Gelb mit einem sehr hellen beige Schleier auf den Seiten
Flanken	Gelb mit einem sehr hellen beige Schleier
Bauch	Schmutzig weiß
Flügel	Große beige gelbe Federn und beige Federkielen. Außengrenze sehr deutlich. Sekundärteile klar beige
Decken	Große beige Decken, kleine und mittlere gelbe Abdeckungen
Schwanz	Die ersten zwei Drittel haben gelbe Federn und das letzte Drittel gold beige ohne Rand, mit Ausnahme der beiden mittleren Schwanzfedern, die nicht gelb sind
Augen	Rot
Schnabel	Fleischfarben
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Fleischfarben



photo FOI

Hinweis: Männchen haben eine Hintergrundfarbe, ist gelb auf der Brust.

Standard COM/OMJ

Grünling weiblich
~ Mutation Satinet ~

Größe : 13/15 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Hellgelb
Kappe, Wangen	Sehr hellbeige
Kehle	Hellgelb
Rücken	Hellgelb mit einem sehr hellen beige Schleier.
Brust, Flanken	Hellgelb mit einem sehr hellen beige Schleier
Bauch	Schmutzig weiß
Flügel	Große beige Federn mit gelben und beigen Federkielen. Außengrenze sehr deutlich am Ende. Sekundärteile klar beige.
Decken	Große beige bedeckt mit einem grauen Schleier. Kleine und mittlere Federn verschleiert gelb beige
Bürzel	Gelb
Schwanz	Erste und letzte Drittel gelb beige Federn ohne Rand, mit Ausnahme der beiden mittleren Federn, die nicht gelb sind.
Augen	Rot
Schnabel	Fleischfarben
Ständer, Krallen	Fleischfarben



Grünling männlich
~ Mutation Lutino ~

Größe : 13/15 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf, Hals, Rücken, Brust, Flanken	Gelb
Bauch	Gelblich weiß
Flügel	Große gelbe Federn mit externen Federkielen, golden und beige Einfassung am Ende. Sekundär gelb
Decken	Gelb
Bürzel	Goldgelb
Schwanz	Gelb mit goldgelbem Außenrand
Augen	Rot
Schnabel	Fleischfarben
Ständer, Krallen	Fleischfarben



Grünling weiblich
~ Mutation Lutino ~

Größe : 13/15 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf, Hals, Rücken, Brust, Flanken	Gelblich weiß
Bauch	Weißlich
Flügel	Große Federn weißlich mit gelben Federn und Federkielen. Sekundär weißlich. Gelbe Schultern
Decken	Große weißlich gelben Decken, kleine und mittlere weißliche Decken
Bürzel	Gelb
Schwanz	Weiß mit kleinem gelben Rand
Augen	Rot
Schnabel	Fleischfarben
Ständer, Krallen	Fleischfarben



Grünling ~ Mutation Pastell ~

Größe : 13/15 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Grün mit grauem Bart und grauen Wangen
Rücken, Brust, Flanken	Oliv-grün mit grauen Spiegelungen
Schulter, Kehle	Grünlich-gelb
Bauch	Weißlich-grau
Flügel	Primäre Federn grau mit dunklen Federkielen externen leuchtend gelb. Sekundär klar grau mit einem dunkelgrauen Rand
Bürzel	Oliv-grün
Schwanz	Gelb an der Basis, hellgraue Federn am Ende verwaschen gelb, dunkler Rand
Augen	Dunkelbraun
Schnabel	Fleischfarben, hellbraun geflammt
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Fleischfarben



Photo KBOF

Geschlechtsunterschiede : Männchen gleichen Eigenschaften, aber das Pigment ist dunkler. Gelbe Rohrflugfedern und Schwanzfedern sind schmaler und stumpfer. Leichter Rucksack-Design sichtbar.

Hinweis: Es ist zu berücksichtigen, dass es Schimmel und intensive Exemplare gibt. Dieser Unterschied ist gut markiert.

Grünling männlich
 ~ *Mutation Achat Pastell (vorläufige Bezeichnung in der Studie)* ~

Größe : 13/15 cm

Photo J.M. Eytorff

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kappe, Wange, Bart	Hellgrau, der Rest des Kopfes ist gelblich grün
Rücken	Oliv-grün, regelmäßiger hellgrauer Schleier
Kehle, Brust, Flanken, Bürzel	Grünlich-gelb, hellgrauer Schleier auf der Brust und an den Seiten
Bauch	Heller als die Brust, grünlich-gelb
Flügel	Primäre Federn grau, entlang der äußeren Federkiele gelb mit einem hellgrauen Rand am Ende. Sekundär grau mit einem sehr breiten lichtgrauen Rand
Decken	Große Federn silbergrau. Grünlich-gelbe Klein- und Mitteldecken
Schwanz	Erste und letzte Drittel der gelben und grauen Federn haben einen hellgrauen Rand mit Ausnahme der beiden mittleren Schwanzfedern, die keine gelbe Feder haben
Augen	Schwarz
Schnabel	Fleischfarben
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Hornfarben



Grünling weiblich
 ~ *Mutation Achat Pastell* (vorläufige Bezeichnung in der Studie) ~

Größe : 13/15 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kappe	Grünlich-gelb mit hellgrauen Streifen
Wangen	Grünlich-gelb verwaschen hellgrau
Bart	Hellgrau
Rücken	Grau mit sichtbarem hellgrauen Streifenmuster
Kehle, Brust	Blass grünlich-gelb mit einem hellen silbrigen Grauschleier
Flanken	Blass grünlich-gelb mit einem leichten Grauschleier und leichter Zeichnung
Bürzel	Grünlich-gelb
Bauch	Etwas heller als die Brust
Flügel	Primäre Federn und entlang der äußeren Federkiele grau-gelb mit hellgrauem Rand. Sekundär grau, mit einem großen, klaren grauen Rand
Decken	Große Decken klar silbergrau, grünlich-gelbe Klein- und Mitteldecken
Schwanz	Die ersten zwei Drittel gelbe und graue Federn, das letzte Drittel mit einem hellgrauen Rand mit Ausnahme der beiden mittleren Schwanzfedern, die keine gelben Federn haben
Augen	Schwarz
Schnabel, Ständer	Fleischfarben
Krallen	Hornfarben

Photo Philippe ROCHER



Grünling

~ *Mutation Isabell pastell (vorläufige Bezeichnung in der Studie) ~*

Größe : 13/15 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf, Bereich zwischen Schnabel und Auge, Kinn, Augenkontur	Gelbe Maske
Ohrenbereich, Scheitel	Gelb mit einem hellen beige Schleier am Hals
Rücken	Gelb mit einem hellen beige Schleier
Brust, Flanken, Bürzel	Gelb
Bauch	Schmutzig weiß
Flügel	Primäre Federn beige mit einem gelben Rand. Beige Sekundärfedern mit einem gelben Rand. Gelbe Decken
Schwanz	Die ersten zwei Drittel gelb-beige
Augen	rötlich
Ständer, Krallen, Schnabel	Fleischfarben



Geschlechtsunterschiede: Männchen gleichen Eigenschaften, aber das Pigment ist weniger hell. Gelbe Rohrflugfedern und Schwanzfedern sind schmaler und stumpfer.

VORSICHT: Gefahr der Verwechslung mit der Satine Vielzahl Isabell

Grünling

~ *Mutation braun pastell* (vorläufige Bezeichnung in der Studie) ~

Größe : 13/15 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Sehr hellbraun
Scheitel, Ohren-, Stirn- und Nackenbereich	Hellbraun. Klare Maske und gelbe Augenbrauen bei den Männern
Rücken	Hellgelb bis trüb hellbraun
Kehle, Brust, Flanken	Hellgelb bis trüb hellbraun
Bauch	Beige creme
Flügel	Hellbraun mit gelben Spiegel
Decken	verschleiert gelb hellbraun
Bürzel	Gelb
Schwanz	Hellbraun, gelber Rand
Augen	Braun
Ständer, Krallen, Schnabel	Fleischfarben



Geschlechtsunterschiede: Männchen gleichen Eigenschaften, aber das Pigment ist dunkler. Gelbe Rohrflugfedern und Schwanzfedern sind schmaler und stumpfer.

ACHTUNG: Verwechslungsgefahr mit Isabelle Vielfach.

Hänfling mélodieuse

(*Carduelis cannabina*)

Männliches Gefieder



Weiblich



Hänfling melidiös männlich (Carduelis cannabina)
~ Phénotype wildfarben ~

Größe : 14cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Schnabel	Leicht grau-braun, im Winter mit blassem Unterschnabel
Augen	Dunkelbraun
Kopf	Stirn und Krone zimtbraun mit cremefarbenen Augenbrauen und einem cremefarbenen Fleck auf jeder Wange
Rücken	Mittelbraun
Schulter	Mittelbraun
Brust	Beige braun mit schwarzen Streifen
Kehle und Kinn	Weißlich mit dunkelbraunen Streifen
Flanken	Hellbraun mit feinen dunkelbraunen Streifen
Bauch	Weißlich
Flügel	Große schwarze Federn mit einem weißen Außenrand. Sekundär : Mittelbraun
Bürzel	Helles Zimt, mit gestrichelten Linien
Schwanz	Schwarze Federn mit weißem Rand entlang der äußeren Federkiele
Ständer	Bräunlich
Krallen	Schwarz
Schnabel	Hell grau-braun, im Winter mit blassem Unterschnabel



Hänfling melidiös weiblich (Carduelis cannabina)
~ *Phénotype wildfarben* ~

Größe : 14cm

Gleiche Eigenschaften wie die männlichen,
bis auf Brust, Kopf und Flanken, die sind mehr gestreift
(äußere weiße Säumung der Handschwingen, schmaler als beim
männlichen Vogel)



Berghänfling

(*Carduelis flavirostris*)



Berghänfling (Carduelis flavirostris) ~ *Phénotype wildfarben* ~

Größe : 14cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Schnabel	Klein, gelb mit schwarzer Spitze
Augen	Dunkelbraun
Kopf	Klein und rund Stirn, Scheitel, Wangen und Hals: ockerbraun , gestreift mit schwarz Bereich zwischen Schnabel und Augen: rostig
Rücken	Ockerbraun, gestreift mit schwarz-braun
Schulter	Ockergelb
Brust	Ockerbraun mit dunkelbraunen Streifen, aus der Mitte der Brust bis zu den Flanken
Kehle	Ockerbraun, leicht gestreift
Flanken	Ockerbraun mit sehr regelmäßigen dunkelbraunen Streifen
Bauch	Schmutzig weiß
Flügel	Schwarzbraun mit einem schmalen weißen Rand entlang der äußeren Schwungfedern
Bürzel	Rosa
Schwanz	Schwarz-braun mit weißer Federsäumung entlang der äußeren Federkiele, Ende des gegabelten Schwanz
Ständer	Schwarzbraun
Krallen	Schwarz

Das Weibchen ähnelt dem Männchen, aber blässere Farbe. Der Schwanz ist aber nie karminrot braun hellgrau mit schmalen schwarzen Streifen



Photo FOI

Art Pyrrhula


Gimpel

(*Pyrrhula pyrrhula europaea*)

Mann



Frau



Größe 15cm

Gimpel (ponceau)

(pyrrhula pyrrhula pyrrhula)



Größe 18 cm,

- Weniger Farbe als der Europäer
- Keine Spur von rot auf dem Rücken

Gimpel (ibère)

(pyrrhula pyrrhula iberiae)



Größe 13,5 cm,

- Bunter als die beiden anderen Unterarten
- Können rote Markierungen auf dem Mantel haben

Gimpel (ibère)


(pyrrhula pyrrhula iberiae)



Gimpel (Pyrrhula pyrrhula) ~ Phénotype wildfarben ~

Größe : 13,5 - 18 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Kappe und die Konturen des Schnabels schwarz. Kurzer Hals
Rücken, Schulter	Blaugrau, ohne eine Spur von rot, außer <i>ssp iberiae</i>
Kehle, Brust, Flanken	Rote Farbe gleichmäßig verteilt und durch die schwarze Kappe unter den Augen begrenzt
Bauch, Unterschwanz	Weiß
Gefieder	Primär- und Sekundärschwungfedern schwarz mit bläulichen Spiegelungen. Grau weiße Streifen an der Außenkante der Flügel nach hinten. Zwei kleine rote Flaumfedern garnieren das Ende des Gefieders
Bürzel	Weiß
Schwanz	Glänzend schwarz
Augen	Schwarz
Schnabel	Schwarz mit kurzem und sehr abgerundetem Ende des leicht gekrümmten Oberkiefers
Ständer, Krallen	Schwarz



Geschlechtsunterschiede: Gleiche Eigenschaften wie der Mann mit matten Farben. Bei den weiblichen ist der Rücken bräunlich grau und die Brust ist braungrau beige getönt.

Gimpel ~ *Mutation pastell* ~

Größe : 13,5 - 18 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Schwarz-braune Kappe, rosa Wangen
Rücken, Schulter	Pastellgrau (grau beige)
Brust	Rosa
Bauch, Unterschwanz	Weiß
Gefieder	Primär- und Sekundärschwungfedern dunkelgrau. Graue Flügelsteile hellbeige. Rosa Flecken auf Gefieder
Bürzel	Weiß
Schwanz	Dunkelgrau mit hellerem Unterschwanz
Augen	Dunkelbraun
Schnabel	Schwarz-braun
Ständer	Dunkelbraun
Krallen	Dunkel

Geschlechtsunterschiede: dieselben Eigenschaften wie die männlichen Vögel mit beigefarbenem Mantel und Brust.



Gimpel männlich Mutation braun ~

Größe : 13,5 - 18 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Sehr dunkelbraune Kappe, fast schwärzlich
Rücken	Hellgrau mit beigen Spiegelungen
Schulter	Hellgrau
Brust, Kehle, Flanken	Rosa
Bauch	Weiß durchzogen
Gefieder	Primäre Federn braun. Sekundär sehr dunkelbraun fast schwarz. Hellgraue Flügelleiste
Decken	Sehr dunkelbraun bis schwärzlich
Bürzel	Weiß
Schwanz	Sehr dunkelbraun mit metallischen Spiegelungen
Augen	Dunkelbraun
Schnabel	Oberschnabel braun, Unterschnabel fleischfarben
Ständer	Sehr hellbraun
Krallen	Braun

Bemerkung: Die Federn haben ihren äußeren Teil sehr dunkelbraun mit metallischen Spiegelungen und Innenteil braun, mit Ausnahme von zwei ganz dunkelbraunen mittleren Federn in metallischem Glanz.

Beim Blick von unten erscheint der Schwanz braun



Photo Philippe ROCHER

Gimpel weiblich
~ Mutation braun ~

Größe : 13,5 - 18 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Dunkelbraune fast schwärzliche Kappe. Beige-braune Wangen
Rücken	Braun-beige verwaschen grau
Schulter	Braun-beige verwaschen grau
Brust, Kehle, Flanken	Sehr gleichmäßig braun-beige
Bauch	Klar, weiß durchzogen
Gefieder	Primäre Federn braun. Sekundär sehr dunkelbraun fast schwarz. Beige graue Flügeleiste
Decken	Sehr dunkelbraun bis schwärzlich
Bürzel	Weiß
Schwanz	Sehr dunkelbraun mit metallischen Spiegelungen
Augen	Dunkelbraun
Schnabel	Oberschnabel braun, Unterschnabel fleischfarben
Ständer	Sehr hellbraun
Krallen	Braun



Photo Driemans

Gimpel männlich
~ Mutation braun pastell ~

Größe : 13,5 - 18 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Stirn, Scheitel, Nacken, Kinn, Bereich zwischen Schnabel und Auge	Haselnussbraun, leicht roter Schleier toleriert den Scheitel
Rücken	Beige hellgrau
Brust, Kehle, Flanken	rosarot
Bauch	Weißer Analbereich
Gefieder	Primäre Federn beige. Sekundär braun und beige. Flügelband klar
Bürzel	Weiß
Schwanz	Braun-beige
Augen	Dunkelbraun
Schnabel	Fleischfarben
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Braun



Gimpel weiblich
~ *Mutation braun pastell* ~

Größe : 13,5 - 18 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Stirn, Scheitel, Nacken, Kinn, Bereich zwischen Schnabel und Auge	Haselnussbraun
Rücken	Beige
Brust, Kehle, Flanken	Beige, hell mit lila verwaschen
Bauch	Weißer Analbereich
Gefieder	Primäre Federn beige. Sekundär braun und beige. Flügelband klar
Bürzel	Weiß
Schwanz	Braun-beige
Augen	Dunkelbraun
Schnabel	Fleischfarben
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Braun



Gimpel ~ *Mutation weiß* ~

Größe : 13,5 - 18 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Weiß
Rücken, Schulter	Weiß
Brust, Kehle, Flanken	hellrosa lachs das weiße Weibchen
Bauch, Unterschwanz	Weiß
Flügel	weißen Federn zwei lachsrosa Decken
Bürzel	Weiß
Schwanz	Weiß
Augen	Schwarz
Schnabel	Fleischfarben
Bauch	Weiß
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Weiß

FEHLER : Farbspuren auf dem Rücken



Photo KBOF



Gimpel ~ Mutation gelb ~

Größe : 13,5 - 18 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kappe und Nacken	Schwarz, um und unter den Augen.
Rücken, Schulter	Graublau
Brust, Kehle, Flanken	Grünlich-gelbe gleichmäßig verteilt
Unterbauch, Unterschwanz, Bürzel	Weiß
Flügel	Primär- und Sekundärschwungfedern schwarz mit bläulichen Spiegelungen. Flügel grau, weißes Band von der Außenkante der Tragfläche in Richtung der Rückseite. Zwei kleine gelbe Flaumfedern garnieren das Ende des Gefieders
Schwanz	Glänzend schwarze Federn
Augen	Schwarz
Schnabel	Schwarz, sehr kurzer leicht gebogener Oberschnabel
Ständer, Krallen	Schwarz



Photo Driesmans

Geschlechtsunterschiede: Das Weibchen hat die gleichen Eigenschaften wie der männliche Vogel, nur die Farben sind stumpfer.

Hinweis: Diese Mutation wurde mit anderen bestehenden Sorten kombiniert.

Gimpel
~ *Mutation braun pastell gelb* ~

Gleiche Eigenschaften wie
Braun Pastell, aber mit
gelbem Bauch und Gesicht



Photo Drijsmans

Gimpel männlich ~ *Mutation Topas* ~

Größe : 13,5 - 18 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Schnabel	Hornfarbig, kurz und massiv
Augen	Dunkelrot
Kopf	Kappe: dunkelgrau mit einem Minimum von rot in der Kappe Wangen: orange-rot
Rücken	Hellblau grau ohne rote Säumung
Brust, Kehle, Flanken	Orange-rot
Bauch	Orange-rot, weiß im unteren Bereich
Flügel	Dunkelgrau, auch mit helleren Flügeln, am Rand des Flügels ausgeglichen. Auf der letzten Feder geflammt
Schwanz und Bürzel	Harmonisches dunkelgrau Weißer Bürzel
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Hornfarben



Photo KBOF

Topas Topas und braunen Sorten sind Pastellstudien

Standard COM/OMJ

Gimpel weiblich
~ Mutation Topas ~

Größe : 13,5 - 18 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Schnabel	Hornfarbig, kurz und massiv
Augen	Dunkelrot
Kopf	Kappe : dunkelgrau. Wangen: hellbraun-grau
Rücken	Dunkel grau-braun, ohne roten Schleier
Brust	Hellbraun-grau
Flanken	Hellbraun-grau (gleiche Farbe wie die Brust)
Bauch	Hellbraun-grau, weiß an der Unterseite
Flügel	Dunkelgrau, auch mit helleren Flügeln, am Rand des Flügels ausgeglichen. Auf der letzten Feder geflammt
Schwanz und Bürzel	harmonisches grau Weißer Bürzel
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Hornfarben



Photo KBOF

Art *fringilla*

Buchfink

(*Fringilla coelebs*)

Männlich



Weiblich



Buchfink männlich (Fringilla coelebs)
~ Phénotype wildfarben ~

Größe : 14 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Stirn	Schwarz
Kappe, Hinterkopf, Nacken	Blaugrau
Wangen, Bereich zwischen Schnabel und Auge, Kinn, Augenbrauenstreifen, Ohrenbereich, Hals, Brust, Flanken	Von braun rosa bis rot-braun
Rücken	Mittelbraun
Schulter	Blaugrau
Bauch	Weißer Analbereich
Gefieder	Primäre braun-schwarz. Seite und der untere Teil des Gefieders braun bis gelblich. Decken und weiße Flügellenden mit kleinen weißen Spiegeln
Bürzel	Oliv-grün mit gelb
Schwanz	Schwarz-braun umrandet mit grünen engen Federn entlang der äußeren Federkiele. Äußere Schwanzfedern mit großen weißen Fleck auf dem unteren Teil
Augen	Dunkelbraun
Schnabel	Stahlblau im Sommer, graubraun zum dunkleren Winterende
Ständer	hellbraun
Krallen	schwärzlich



Photo Philippe ROCHER

Buchfink weiblich (Fringilla coelebs)
~ Phénotype wildfarben ~

Größe : 14 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf, Rücken, Brust	Grau-braun
Kehle	Grau-braun, ohne helle Flecken
Schulter	Braun-beige
Flanken	Grau-braun
Bauch	Schmutzig weißer Analbereich
Gefieder	Wie die männlichen, aber brauner. Der Flügel ist auch weniger weiß
Bürzel	verwaschen gelblich-grün
Schwanz	Wie die männlichen, aber brauner
Augen	Dunkelbraun
Schnabel	Grau-braun
Ständer	Hellbraun
Krallen	Schwärzlich



Buchfink männlich
~ Mutation braun ~

Größe : 14 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Braun mit dunklem Stirnband
Kehle, Brust	Braun wie Burgunder
Rücken	Braun
Flanken	Braun wie Burgunder
Bauch	Hellbraun
Gefieder	Primäre Federn braun mit einem weißen Spiegel. Sekundär braun
Decken	Große braune Flügel mit cremefarbener Zeichnung. Mittlere Decken braun mit weißer Schulter. Kleine braune Decken
Bürzel	Braun
Schwanz	Braun mit weißer Zeichnung unter dem Schwanz
Augen	Dunkelbraun
Schnabel	Hellbraun
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Fleischfarben



Buchfink weiblich
~ Mutation braun ~

Größe : 14 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf, Rücken, Brust	Mittelbraun
Kehle	Mittelbraun
Flanken	Mittelbraun
Bauch	Analbereich creme-weiß
Gefieder	Primäre Federn mittelbraun mit einem weißen Spiegel. Sekundär mittelbraun
Decken	Groß: mittelbraun erstreckt sich bis weißem Spiegel. Mittlere: braun mit weißen Flecken an der Schulter. Kleine: mittelbraune Federn
Bürzel	Mittelbraun
Schwanz	Mittelbraun mit weißer Zeichnung unter dem Schwanz
Augen	Dunkelbraun
Schnabel	Hellbraun
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Fleischfarben



Buchfink männlich
~ Mutation Achat ~

Größe : 14 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Stirn	Schwarz
Krone,Hinterkopf, Nacken	Blaugrau
Wangen, Bereich zwischen Schnabel und Auge, Kinn, Augenbrauenstreifen, Ohrenbereich, Hals, Brust, Flanken	Rosa braun
Rücken	Braun-grau
Bauch	Analbereich weiß
Flügel	Primäre Federn schwarz. Sekundär : schwarz mit einem gelblichen Rand an ihrem unteren Teil. Decken (Schultern) weiß. Weiße Flügelleisten und ein kleiner weißer Spiegel
Bürzel	Oliv-grün mit gelb
Schwanz	Schwarze eng eingefasste Federn mit grünen äußeren Federkielen. Die äußeren Schwanzfedern haben einen großen weißen Flecken auf dem unteren Teil
Augen	Dunkelbraun
Schnabel	Stahlblau im Sommer, graubraun zum dunkleren Winterende
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Dunkel



Photo KBOF

Buchfink weiblich
~ Mutation Achat ~

Größe : 14 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf, Rücken	Hellbraun grau, mit zwei dunkelgrauen Streifen auf dem Scheitel und unter dem Hals
Kehle, Brust	Hellgrau
Rücken, Schulter	Hellbraun grau
Flanken	Hellbraun grau
Bauch	Analbereich schmutzig weiß-grau
Flügel	Primäre Federn schwarz. Sekundär : schwarz mit einem gelblichen Rand an ihrem unteren Teil. Decken (Schultern) weiß. Flügelleisten weniger weiß als die Männchen und kleine weiße Spiegel
Bürzel	verwaschen gelblich-grün
Schwanz	Schwarze eng eingefasste Federn mit grünen äußeren Federkielen. Die äußeren Schwanzfedern haben einen großen weißen Flecken auf dem unteren Teil
Augen	Dunkelbraun
Schnabel	Hellbraun leicht grau geflammt
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Dunkel



Photo KBOF

Buchfink männlich ~ *Mutation Opal* ~

Größe : 14 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Stirn	Schwarz
Krone, Hinterkopf, Nacken	Dunkelblaugrau
Wangen, Bereich zwischen Schnabel und Auge, Kinn, Augenbrauenstreifen, Ohrenbereich	Gelblich verschleiert
Schulter	Dunkelblaugrau
Kehle, Brust, Flanken	Graublau
Rücken, Bürzel	Grünlich-gelb, mit bläulichen Spiegelungen.
Bauch	Schmutzig weißer Analbereich
Flügel	Primäre Federn grau blau. Sekundär grau blau mit einem gelben Rahmen an ihrer Unterseite. Decken (Schultern) weiß. Grünlich-gelbe Flügelspitzen und kleiner weißer Spiegel
Schwanz	Bläulich-graue eng eingefasste Federn mit grünlich-gelben Federn entlang der äußeren Federkielen. Die äußeren Schwanzfedern haben einen großen weißen Flecken auf dem unteren Teil
Augen	Dunkelbraun
Schnabel	Dunkelblaugrau im Sommer, dunkelgrau im Winter
Ständer	Dunkelfleischfarben
Krallen	Dunkel



Photo A. CUPIDO

Buchfink weiblich
~ Mutation Opal ~

Größe : 14 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Hell bläulich-grau mit zwei dunkleren Streifen auf dem Scheitel und unter dem Hals
Rücken	Grünlich-gelb mit einem blauen Schleier
Schulter	hellgraublau
Kehle, Brust, Flanken	Hellgrau verwaschen gelblich
Bauch	Anal-Bereich schmutzig grau weiß
Flügel	Wie die männlichen, nur heller blaugrau
Bürzel	Grünlich-gelb
Schwanz	Wie die männlichen, nur heller blaugrau
Augen	Dunkelbraun
Schnabel	Dunkelfleischfarben hellgrau geflammt
Ständer	Dunkelfleischfarben
Krallen	Dunkel



Photo UOF

Buchfink ~ *Mutation braun Opal* ~

Größe : 14 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf, Rücken, Schultern Kehle, Brust, Flanken Bauch, Flügel, Bürzel Schwanz, Augen	Das Gefieder ist fast völlig frei von Pigment Eumelanin.
	Es ist noch ein leichter Schleier von Phäomelanin auf der Rückseite, den Flugfedern und dem Schwanz.
	Rücken, Brust und Bürzel sind cremig gelb bei den männlichen, sehr hellbeige bei den weiblichen Vögeln
	Braun
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Fleischfarben



photo UOF

Bergfink

(*Fringilla montifringilla*)

Männlich Winterkleid



Hochzeitskleid

Bergfink männlich (Fringilla montifringilla) ~ *Phénotype wildfarben* ~

Größe : 14 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Schnabel	Gelb mit schwarzer Spitze
Augen	Dunkelbraun
Kopf	Stirn-, Scheitel-, Hals-, Wangen- und Ohrregion: eine schwärzliche Farbe, eingefasst mit grau-braun. Diese Farbe ist gleichmäßig verteilt. Im Sommer ist der Kopf komplett schwarz
Rücken und Bürzel	Rücken : schwarz schuppig grau-braun (schwarz im Sommer) Bürzel: weiß
Kehle	Haselnussbraun
Brust	Nussig ohne Segeln und gleichmäßig in der Brust braune Farbe verteilt. Die Linie zwischen der braunen Brust und weißem Bauch sollten regelmäßig und leicht abgerundet sein.
Flanken	Die Farbe der Seitenwände ist hellbraun mit vorzugsweise zwei Reihen schwarzer Flecken, die gleichmäßig verteilt sind. Die erste Zeile wird oft durch die Flügel ausgeblendet. Die Flecken der Männer sind größer und neigen stärker als bei den weiblichen
Bauch	Reines weiß
Flügel	Die Schulterfedern sind haselnussbraun und mit einem schmalen Rand gesäumt. Die Flügelspitze hat die gleiche Farbe wie der Brust (Haselnuss). Ein kleiner weißer Spiegel ist obligatorisch. Die Grundfarben sind dunkel braunschwarz Sekundäre Flugfedern sind bräunlich schwarz mit hellbraunen äußeren Federkielen.
Schwanz	Die Schwanzfedern sind schwarz. Beide haben eine große äußere Feder, längs einen weißen Fleck auf der unteren Seite. Die mittleren Schwanzfedern sind am Ende schwärzlich mit einem braunen Rand. Das Ende des Schwanzes ist gegabelt.
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Schwarz



Hochzeitskleid



Winterkleid

Photos Philippe ROCHER

Bergfink weiblich (Fringilla montifringilla)
~ Phénotype wildfarben ~

<u>Größe :</u>	14 cm
Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Wie die männlichen, aber die Farben sind ganz grau-braun. Zwei bräunlichen Streifen gehen von der Spitze des Kopfes bis in den Nacken.
Rücken	Typische Schuppenzeichnung der grau-braunen Farbe
Flügel	Wie die männlichen, aber mattere Farbe.
Flanken	Die Flecken sollten gut verteilt und regelmäßig in zwei Reihen und auf einem hellbraunen Hintergrund sein.
Brust	Die Farbe kann nicht ausgewaschen werden, wie eine Haselnuss
Bauch	Grau-weiß
Schwanz	Dunkelbraun, gegabelt



Art *serinus*

Girlitz

(*Serinus serinus*)

männlich



weiblich



Girlitz männlich (Serinus serinus)
~ Phénotype wildfarben ~

Größe : 11cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Schnabel	Klein, kurz, konisch und dunkelgrau
Augen	Dunkelbraun
Kopf	Leuchtend gelb an der Basis des Schnabels, an den Augen grau-grün, grau-braun gestreift an Hals und Wangen. Einige ältere Männchen haben einen gelben Fleck auf den Wangen
Hals	Halsband gelblich
Rücken	Bräunlich grau schwarz gestreift
Schulter	Braungrau
Brust	Leuchtend gelb
Kehle	Leuchtend gelb
Flanken	Von hellgelb im Schulterbereich bis hellgrau
Bauch	Hellgrau
Flügel	Dunkelbraun mit grünlich-gelben Einfassungen zum äußeren Rand der Federn
Bürzel	Leuchtend gelb
Schwanz	Braun-schwarz
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Dunkelbraun



Girlitz weiblich (Serinus serinus)
~ *Phénotype wildfarben* ~

Größe : 11cm

Das Weibchen hat die gleichen Eigenschaften wie das männliche, aber die leuchtend gelbe Farbe des Männchens ist stärker gedämpft.

Das Weibchen ist auf der Kehle, Brust und Flanken gestrichelt. Die Streifen sind breiter und deutlicher.



Zitronengirlitz

(*Serinus cintrinella*)

männlich



weiblich



Zitronengirlitz männlich (*Serinus cintrinella*)
 ~ *Phénotype wildfarben* ~

Größe: 12cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Schnabel	Spitzes Ende, schwarz-grau
Augen	Braun-schwarz
Kopf	Fein. Oben und an den Seiten des Kopfes, der Hals und an den Seiten des Halses bläulich-grau überzogen. Hell gelb-grüne Stirn, Augenpartie, untere Wangen und Kinn. Kreisförmige Maske
Rücken	Oliv-grün mit grau-braunen Streifen, ziemlich hell
Kehle, Brust	Gelb-grün, hell wie die Maske (Kopf)
Flanken	Grün, grau verwaschen
Bauch	Anal-Region und Unterschwanz: gelb
Flügel	Federn: grünlich-schwarz mit grau-grünem Außenrand. Decken: schwärzlich grün mit breiten Rand, Zeichnung eines Doppelflügels
Bürzel	Gelb-grün
Schwanz	Federn: grünlich-schwarz, mit grau-grün eingefasst
Ständer	Grau-braun
Krallen	Braun-schwarz
Allgemeine Form	Fein und elegant



Zitronengirlitz weiblich (Serinus cintrinella)
~ *Phénotype wildfarben* ~

Größe : 12cm

Die Frau hat die gleiche Farbgebung wie der Mann

ein wenig mattere Farbtöne, eine weniger umfangreiche Maske und etwas stärker ausgeprägte Streifen.

Die bläulich-graue Farbe wird nicht durch die Kehle unterbrochen



Zitronengirlitz Korsika (Serinus cintrinella corsica)
~ *Phénotype wildfarben* ~

Größe: 12cm

In der Art *Serinus cintrinella corsicana*:

- Der Mantel hat ein warmes braun und die Brust ist lebendig gelb-grün
- Das Weibchen ist matter



Art *loxia* (Kreuzschnäbel)

Hinweis :

- *Im ersten Jahr kann die Farbe der jungen Männchen weniger intensiv sein (ocker)*

Fichtenkreuzschnabel

(Loxia curvirostra)

männlich



weiblich



Fichtenkreuzschnabel männlich (Loxia curvirostra)
~ Phénotype wildfarben ~

Größe : 16.5cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Schnabel	Dunkelgrau braun komplett überkreuzt. Wurzel des Unterschnabels blasser. Die Schnäbel können sich von der einer oder der anderen Seite überkreuzen.
Augen	Dunkelbraun
Kopf	Stirn, Scheitel und Nacken: rot mehr oder weniger intensiv. Einige Kreuzschnäbel haben eine skalierte Zeichnung auf dem Scheitelpunkt, während andere einen gleichmäßig farbigen Scheitelpunkt haben (beide sind gültig). Braune Hufeisenzeichnung auf den Wangen. Bereich zwischen Schnabel, Auge und Ohrenbereich: dunkelbraun-rosa. Unterseite des Halses weniger rot
Rücken	Mantel- und Schulterfedern braunrot (weniger rot als die Brust)
Brust	Rötlich braun
Flanken	Rötlich braun
Bauch	Gräulich weiß wie auch der Analbereich
Flügel	Primärfarben: bräunlich schwarz mit einem schmalen bräunlich rotem Kiel entlang der äußeren Federkiele. Die letzte Feder hat einen grauen Rand. Zusätzliche Flügeldecke dunkelbraun. Kleine und mittlere Flügeldecken haben einen rötlichen Rand.
Schwanz	Federn: bräunlich schwarz mit schmalen Rand oder rötlicher Unterschwanz: grau mit einer skalierten Zeichnung (V-Form)
Ständer	Dunkelbraun
Krallen	Schwarz



Photo UOF

Fichtenkreuzschnabel weiblich (Loxia curvirostra)
~ *Phénotype wildfarben* ~

Größe : 16.5cm

Das Weibchen hat die gleichen Markierungen wie das Männliche, aber die Farbe von fast allen Körperteilen ist oliv-grün.

Das Weibchen ist braun gestreift, wie das männliche, vor allem am Kopf, Brust, Rücken und die Flanken. Der Schwanz ist grünlich-gelb.

Das Weibchen hat in der Regel eine typische hellgrauen Stirnform.



photo UOF

Bindenkreuzschnabel

(Loxia leucoptera bifasciata)



Bindenkreuzschnabel männlich (Loxia leucoptera)
~ Phénotype wildfarben ~

Größe : 14.5cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Schnabel	Hornfarben, länglich. Die Unterkiefer kreuzen am Ende in einer sehr deutlichen Weise
Augen	Schwarz
Kopf	Voll karminrot, leicht schuppig mit loreale Fläche und Zeichnung auf grauen Wangen. Die Oberseite des Kopfes und Halses sind hellrot (Blutunterlaufungen)
Rücken	Karminrot, etwas grau verschleiert und gesäumt
Kehle und Brust	Karminrot
Flanken	Karminrot grau verwaschen
Bauch	Karminrot verblassend zu schmutzig weiß auf Analbereich. Karminrot grau verwaschen
Flügel	Federn: schwarz, mit weiß eingefasst. Äußere Sekundärteile in besonderem Maße weiß gezeichnet. Decken: schwarz mit einem klaren weißen Rand, die eine Doppelflügelleiste zeichnet.
Bürzel	Karminrot, leicht gesäumt
Untere Schwanzfeder	Tragen eine typisch gesäumte Zeichnung, die regelmäßig sein muss.
Schwanz	Eher kurz, leicht eingerückt. Federn: schwarz, fein mit grau eingefasst
Beine	Braun grau. Robust und relativ kurz.
Füße	Braun grau
Krallen	Hornfarben



Photo Philime ROCHER

Bindenkreuzschnabel weiblich (Loxia leucoptera)
~ Phénotype wildfarben ~

Größe : 14.5cm

Das Weibchen hat die gleichen Markierungen wie das Männliche, aber die Farbe von fast allen Körperteilen ist oliv-grün-grau.

Das Weibchen ist braun gestreift, wie das männliche, vor allem am Kopf, Brust, Rücken und die Flanken. Der Schwanz ist grünlich-gelb.

Das Weibchen hat in der Regel eine typische hellgraue Stirnform.



Kiefernkreuzschnabel

(*Loxia pytyopsittacus*)



männlich



Loxia scotica
Schottischer Kreuzschnabel

männlich

Kiefernkreuzschnabel männlich (Loxia pytyopsittacus)
~ Phénotype wildfarben ~

Größe : 17cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Schnabel	Hornfarbig, kraftvoll, ziemlich schwere Form. Die Enden der Unterkiefer sind kürzer wie beim Fichtenkreuzschnabel .
Augen	Schwarz
Kopf	Groß, kraftvoll in den Schultern eingebettet. Stirn und Scheitel: wie karminrote Backsteine. Bereich zwischen Schnabel und Auge und Hals: braun verschleiert. Wangenzeichnung braun.
Rücken	Rot- braun mit einer starken hellen gemischten Zeichnung.
Kehle	Karminrot wie Backsteine
Brust	Rot mehr oder weniger braun verschleiert
Flanken	Braunrot
Bauch	Grau-weiß, leicht gestreift an den Seiten.
Flügel	Federn: schwarzbraun, trägt einen schmalen klaren Rand. Große Decken: rötlich braun gesäumt.
Bürzel	Karminrot wie Backsteine
Untere Schwanzfeder	Trägt eine typische Zeichnung, die glatt sein muss.
Schwanz	Kurzgeschnittene Federn: schwarz-braun, schmal braun gesäumt.
Ständer	Hornfarbig, kurz und robust.
Krallen	Braun schwarz.

Photo Philippe ROCHER



Kiefernkreuzschnabel weiblich (Loxia pytyopsittacus)
~ Phénotype wildfarben ~

Größe : 17 cm

Das Weibchen hat das gleiche Muster wie das Männchen.
Rot ist von einer oliv-braunen Tönung ersetzt,
helle Brust und Bürzel.
Die Leisten sind stärker ausgeprägt.



Photo Philippe ROCHER

Art *pinicola*

Hakengimpel

(*Pinicola enucleator*)

Männliche Erwachsene



weiblich





Männlich 1. Jahr



Photo RBOF

Hakengimpel männlich (Pinicola enucleator) ~ *Phénotype wildfarben* ~

Größe : 20cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Schnabel	Schwarzgrau, leistungsstark. Geschwungener Oberkiefer, der ein nach unten gebogenes hakenförmiges Ende hat.
Augen	Schwarz
Kopf	Ziemlich schmal und flach, karminrosa, schwarzgraue Spiegelungen auf Kopf und Augenbereich.
Hals	Groß und kräftiger Hals, wenig ausgeprägt, rosa karminrot.
Rücken	Groß, rosa karminrot, markiert eine sehr regelmäßige schwarzgraue Zeichnung.
Kehle und Brust	Vollständig rose karminrot.
Flanken	Schmalband hellgrau zur Hervorhebung der Flügel.
Bauch	Rosa Brust versetzt mit weißlich grau, heller zum Analbereich.
Flügel	Primäre Federn: schwärzlich, Federkiele haben einen grauen dünnen Rahmen. Sekundär: schwärzlich, im Großen und Ganzen eingefasst mit weißen Federn, insbesondere am Ende Decken: schwarz mit weißem Rand und bilden eine sehr deutliche Doppelflügelleiste.
Bürzel	Rosa-Karminrot
Schwanz	Ziemlich lang und gegabelt. Federn: schwärzlich, haben einen sehr geringen grau-braunen Rand.
Ständer	Grau-schwarz
Krallen	Grau-schwarz

**Rose-karminrot Farbe wird erst ab dem zweiten Jahr angegeben.
Im ersten Jahr ist die Farbe mehr oder weniger intensiv orange.**

Foto : männlicher Erwachsener



Photo Philippe ROCHER

Hakengimpel weiblich (Pinicola enucleator)
~ *Phénotype wildfarben* ~

Größe : 20cm

Die Farben sind matter und der Farbton karminrot rosa ist von einem gelblich grauen Farbton ersetzt.

Der Schwanz ist grau.



Art *coccothraustes*
Kernbeisser

Kernbeisser

(*Coccothraustes coccothraustes*)

männlich



Gefieder männlich
Hochzeitskleid




Kernbeisser männlich (Coccothraustes coccothraustes)
~ Phénotype wildfarben ~

Größe : 18cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Schnabel	Im Winter : hell hornfarben Im Sommer: stahlblau
Augen	Braungrau. Augenringe: rötlich-braun.
Kopf	Der Oberkopf ist braun. Helle Vorderseite und dunkler Hinterkopf . Die Stirn, der Bereich zwischen Schnabel und Augen, Kinn und um den Schnabel sind schwarz. Die Ohrregion und die Wangen sind gelblich braun. Untere Wangen und der untere Teil des Halses sind hellgrau.
Rücken	Rücken, Mantel- und Schulterfedern sind dunkelbraun. Der untere Rücken ist graubraun. Bürzel und der obere Schwanz sind gelblich braun.
Kehle	Kinn und Hals schwarz mit einer leichten hellen Umrandung des Latzes (wird bei der Beurteilung bevorzugt).
Brust	Braungrau, hellrosa verwaschen
Flanken	Grau-braun, dunkler als die Brust
Bauch	Weißlich grau mit weißem Unterschwanz
Flügel	Primär-und Sekundärschwungfedern sind schwarz mit metallischen Spiegelungen. Das Ende der inneren Primär-und Sekundärfedern ähnelt einer Sichel. Große Decken sind weiß und bilden eine Flügelleiste.
Schwanz	Kurz. Die mittleren Schwanzfedern sind rötlich und die äußeren Schwanzfedern sind schwarz mit einer weißen Spitze. Dies bildet ein weißes Band am Ende des Schwanzes.
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Dunkelbraun.



Photo Philipp ROCHER



Hochzeitskleid

E. Gómez

Kernbeisser weiblich (Coccothraustes coccothraustes)
~ Phénotype wildfarben ~

Größe : 18cm

Das Weibchen hat die gleichen Eigenschaften wie das Männchen, nur die Farben sind blasser und grauer.

Das Schwanzende des Weibchens ist weniger weiß als das der Männchen.



photo UOF

Art *rhodopechys*

Wüstengimpel

(*Rhodopechys githaginea*)

Männlich

Hochzeitskleid



weiblich



Wüstengimpel (*Rhodopechys githaginea*)
 ~ *Phénotype wildfarben* ~

Größe : 12,5cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Schnabel	Orange, kurz, stark, ziemlich breit an der Basis.
Augen	Schwarz
Kopf	Ziemlich schmal, schwach gerundet, schlanke Form. Hals: länglich, silbergrauer Kopf
Rücken	Bräunlich-grau
Brust	Grau mit hellrosa Spiegelung, wie burgunderrot
Flanken	Das gleiche grau wie die Brust
Bauch	Wie die Brust, Ausnahme der Analbereich ist hellgrau
Flügel	Lang und dünn. Primärfarben dunkelgrau Sekundärteile: grau-braun. Decken: grau-braun Äußere Federkiele, Flugfedern und Decken haben einen hellen Rand
Schwanz	Mittellang, leicht eingerückt. Federn: dunkelgrau, gesäumt mit einer klaren Rand
Ständer	Ziemlich lang, fein und fleischfarben
Krallen	Grau-beige
Allgemeine Form	elegant und fein



Männliches Winterkleid



Das Weibchen ist matter und der Schnabel ist klarer

Passeridés

Art *Passer*

Haussperling (*Passer domesticus*) ~ ***Phénotype wildfarben*** ~

Größe : 14.5 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Die Fläche unter dem Auge	Schwarz. Vom Auge her besteht ein kastanienbrauner Streifen, der sich in Richtung Hals verbreitert. Kleiner weißer Fleck hinter dem Auge.
Stirn, Scheitel, Nacken	Grau
Wangen, Ohrenbereich	Weißlich-grau
Kehle, Kinn, Brust	Sommer: schwarz. Winter: grau-schwarz mit einem Muster, nicht so klar wie im Sommer. Der Rest der Brust ist weiß.
Schulter	Schulter braun schwarz gestreift mit grau-weißem Rand, hat ein Muster auf den Schultern.
Rücken	Mantel hellbraun schwarz gestreift. Unterer Rücken gräulich weiß.
Flanken	Grau-weiß Schattierung wie Isabell.
Gefieder	Braun mit schwarzen primären Rand, rötlich entlang der äußeren Federkiele.
Decken	Kleine : hellbraun. Mittlere : schwarz-braun mit einem weißlichen Rand. Große : braun- rot mit breiten weißen Außenrand.
Bürzel	Braungrau
Schwanz	Schwarze Federn braun mit grauem Rand . Decken rotbraun.
Augen	Dunkelbraun
Schnabel	Im Winter graubraun mit gelb an der Wurzel. Im Sommer schwarz.
Ständer	Hellbraun
Krallen	Schwarz



Haussperling weiblich (Passer domesticus)
~ Phénotype wildfarben ~

Größe : 14.5 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Braun, mit gelb-braunem Augenbrauenstreifen, an der Basis des Schnabels bis zur Nackenregion.
Kehle, Brust	Braun Grau. Kein Latz oder schwarze Blende.
Schulter, Bauch	Grau-braun.
Rücken	Braun mit schwarzen Streifen, braun dominiert.
Flanken	Grau-braun, ein wenig dunkler als die Brust.
Flügel	Wie die männlichen, aber die Ränder der Federn sind blasser braun. Typisches Flügelband.
Bürzel	Braun.
Schwanz	Wie die männlichen, aber die Ränder der Federn sind blasser braun.
Augen	Dunkelbraun
Schnabel	Hornfarben
Ständer	Hellbraun
Krallen	Schwarz



Haussperling männlich *~ Mutation braun ~*

Größe : 14.5 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Bereich zwischen Schnabel und Auge	Dunkelbraun. Rötlich braune Streifen hinter den Augen, die sich um den Hals verbreitern. Kleiner weiße Fleck hinter den Augen.
Stirn, Scheitel, Nacken, Bürzel	Braun-beige.
Wangen, Ohrenbereich	cremefarben
Kehle, Kinn, Brustmitte	Sommer: dunkelbrauner Latz. Winter: dunkelbraun mit einer Zeichnung, nicht so klar wie im Sommer. Der Rest ist dunkel.
Schulter	Braun-rot gestreifte Schulterfedern mit hellbraunem Rand.
Rücken	Brauner Mantel mit rötlich-braun gestreiften Spiegelungen in dunkelbraun.
Flanken	Dunkle cremefarben
Gefieder	Dunkel mit hellbraunen Rand entlang der äußeren Federkiele, braune Primärfarben.
Decken	Kleine rötlich braun. Dunkle Federn mit einem hell- bis mittelbraunem Rand enden in einem hellbraunen großen braunen Rand. Weitere weißliche Flügelstangen zwischen den mittleren und großen Decken.
Schwanz	Mittelbraune Federn mit hellbraunen Außenrand
Augen	Dunkelbraun
Schnabel	Im Winter gelb-fleischfarben an der Basis des Schnabels, im Sommer braun
Ständer	Fleischfarben gelb
Krallen	Fleischfarben



Haussperling weiblich
~ Mutation braun ~

Größe : 14.5 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Stirn, Scheitel, Nacken	Mittelbraun
Augenbrauenlinien, Bereich zwischen Schnabel und Augen	Cremerfarben
Wange	Hellbraun
Kehle, Brust, Bauch, Flanken	Sehr regelmäßiges gelblich-braun
Rücken	Mittelbraun-gestreift mit dunkelbraun
Gefieder	Dunkel braun mit hellen Federkielen
Decken	Flügelleiste zwischen den mittleren und größeren Decken ist helles Creme. Die Enden der größeren Decken bilden eine hellbraunen Flügelleiste.
Bürzel	Mittelbraun
Schwanz	Mittelbraun
Augen	Dunkelbraun
Schnabel	Fleischfarben-gelb an der Basis
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Dunkel fleischfarben



Photo Driesmans

Haussperling männlich ~ *Mutation « phaéo »*~

Größe : 14.5 cm

Vererbung: der Name "Phaeo" umfasst derzeit verschiedene Erbanlagen unter dem gleichen Aussehen. Studieren im Gange, um unterschiedliche Bezeichnungen festzustellen.

Bereiche des Gefieders	Farbe
Bereich zwischen Schnabel und Auge	Hellbraun
Stirn, Scheitel, Nacken	Hellbraun
Augenbrauenstreifen	Braun vom Auge bis zum Nacken
Wangen, Nackenbereich	Schmutzig weiß mit hellbraunem Schleier
Kehle	Typische Zeichnung hellbraun
Brust, Bauch	Schmutzig weiß
Rücken	Schmutzig weiß mit Zeichnung Phaeo (braune Grenze) auf dem ganzen Rücken
Flanken	Schmutzig weiß mit hellbraunem Schleier
Gefieder	Schmutzig weiß mit braunem Rand
Decken	Kleine braun. Mittlere und große schmutzig weiß mit braunem Rand. Schmutzig weißen Flügelleiste zwischen mittleren und großen Decken.
Bürzel	Beige mit braunem Rand
Augen	Dunkelbraun
Schnabel	Fleischfarben. Manchmal dunkel an der Basis
Ständer, Krallen	Fleischfarben



photo Driessmans

Haussperling weiblich ~ *Mutation « phaéo »*~

Größe : 14.5 cm

Vererbung: der Name "Phaeo" umfasst derzeit verschiedene Erbanlagen unter dem gleichen Aussehen. Studieren im Gange, um unterschiedliche Bezeichnungen festzustellen.

Bereiche des Gefieders	Farbe
Stirn,Scheitel,Hinterkopf	Schmutzig weiß mit braunem Schleier.
Augenbrauenstreifen, Nacken, Bereich zwischen Schnabel und Augen, Wangen,	Mittelbraun
Kehle, Brust, Flanken	Hellbraun
Bauch	Hellbraun, aber heller als die Brust.
Rücken	Schmutzig weiß mit sehr ausgeprägter braunen Zeichnung Phaeo.
Flügel	Gleich wie die männlichen, sind aber mittelbraun
Bürzel	Mittelbraun mit dunklem Rand
Schwanz	Schmutzig weiß mit mittelbraunen Rändern
Augen	Dunkelbraun
Schnabel	Fleischfarben. Kann eine dunkle Flamme an der Basis des Schnabels zeigen.
Ständer, Krallen	Fleischfarben



Haussperling männlich *~ Mutation Achat ~*

Größe : 14.5 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Bereich zwischen Schnabel und Augen	Schwarz
Stirn, Scheitel, Nacken	Hell grau-braun.
Augenbrauenstreifen	Rot braun. Kleine weiße Punkte hinter den Augen.
Wangen	Grau-beige
Kehle	Typisch : schwarzer Latz.
Brust, Bauch, Flanken	Grau-beige
Rücken	Braun beige gestreift
Gefieder	Beige mit einem leichten nussbraunen Rand.
Decken	Kleine : haselnussbraun. Mittlere : beige mit weißlichem Flügelband. Große : beige-braun mit beigem Rand.
Schwanz	Beige mit hell beige-braunem Rand
Bürzel	Beige
Augen	Dunkelbraun
Schnabel	Schwarz im Sommer und dunkelfleischfarben-gelb an der Basis im Winter
Ständer, Krallen	Fleischfarben



Haussperling weiblich ~ *Mutation Achat* ~

Größe : 14.5 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Grau-dunkelbraun mit hellbeige-braunem Augenbrauenstreifen.
Kehle, Brust	Beige mit ivoire
Bauch, Flanken	Beige mit ivoire
Rücken	Beige braun mit schwarz gestreift.
Gefieder	Beige
Decken	Kleine : hellbraun. Mittlere : dunkelbraun mit einem schmutzig weißen Rand, der in einen Flügelband endet. Große : dunkel mit einem hell beige braunem Rand
Bürzel	Beige
Schwanz	Beige mit hellen Randfedern
Augen	Schwarzbraun
Schnabel	Fleischfarben-gelb an der Basis
Ständer, Krallen	fleischfarben



Photo UOF

Haussperling männlich ~ *Mutation Opal* ~

Größe 14.5cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Bereich zwischen Schnabel und Augen	Graublau
Stirn, Scheitel, Nacken	Silbergrau
Augenbrauenstreifen	Blaugrau haselnussfarben
Wangen	
Kehle	Silbergrau mit der typischen blau-grau-Zeichnung Opal.
Brust, Bauch	Silbergrau
Rücken	Silbergrau blau grau gestreift.
Flügel	Silbergrau blau grau gestreift. Ein leichter haselnussbrauner Schleier ist immer noch in den Ecken sichtbar.
Schwanz	Silbergrau mit blau-grauen Rändern.
Bürzel	Silbergrau
Augen	Schwarz
Schnabel	Dunkel bläulich-schwarz im Winter und im Sommer fleischfarben.
Ständer, Krallen	Dunkel fleischfarben



Photo UOF

Haussperling weiblich ~ Mutation Opal ~

Größe : 14.5 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Graublau
Augenbrauenstreifen	Hellgrau mit beige
Bereich zwischen Schnabel und Augen	Dunkelblau Grau
Kehle, Brust, Bauch	Silbergrau
Rücken	Silbergrau blau grau gestreift.
Gefieder	Hellblau grau beige mit Rand auf den Decken, so dass immer noch die typischen Zeichnungen sichtbar sind
Bürzel	Silbergrau
Schwanz	Silbergrau
Augen	Schwarz
Schnabel	Dunkel grau-schwarz im Winter und im Sommer fleischfarben.
Ständer, Krallen	Dunkel fleischfarben



Photo KBOF

***Haussperling männlich
~ Mutation braun pastell ~***

Größe : 14.5 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kappe	Dunkelbeige
Augenbrauenstreifen	Braun
Wangen	Cremerfarben
Kehle	Braun beige Latz
Brust, Bauch, Flanken	Beige
Rücken	Hellbraun
Gefieder	Primär und sekundär : hellbeige mit Rand entlang der äußeren Federkiele
Decken	Kleine hellbraun. Mittlere hellbraun mit einer hellbeige Flügelleiste. Große hellbraun. Hellbraune Schulterfedern.
Schwanz	Beige Federn mit einem klaren Rand entlang der äußeren Federkiele.
Bürzel	Cremerfarben
Augen	Dunkelbraun
Schnabel	Fleischfarben gelb an der Wurzel
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Hornfarben



Photo UOF

Haussperling weiblich
~ Mutation braun pastell ~

Größe: 14.5 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Creme mit auffälligem Augenbrauenstreifen
Wangen	Creme beige
Kehle, Brust	in der Regel cremefarben
Bauch, Flanken	in der Regel cremefarben
Rücken	Creme beige
Gefieder	Beige-creme mit einem klaren Rand entlang der äußeren Federkiele
Decken, Schulterfedern	Creme beige
Bürzel	Creme
Schwanz	Beige-creme mit einem klaren Rand entlang der äußeren Federkiele
Augen	Dunkelbraun
Schnabel	Fleischfarben gelb an der Wurzel
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Hornfarben

photo UOF



Haussperling ~ *Mutation ino (ex-albino)*~

Größe : 14.5 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Weiß, leicht mit gelb gefärbt.
Kehle, Brust	Weiß, leicht mit gelb gefärbt.
Bauch, Flanken	Weiß, leicht mit gelb gefärbt.
Rücken	Weiß, leicht mit gelb gefärbt.
Flügel	Weiß, leicht mit gelb gefärbt.
Bürzel	Weiß, leicht mit gelb gefärbt.
Schwanz	Weiß, leicht mit gelb gefärbt.
Augen	Rot
Schnabel	Fleischfarben
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Fleischfarben



photo Driemans

Haussperling
~ Mutation weiß ~

Größe : 14.5 cm

Zones du plumage	Couleur
Kopf	Weiß
Kehle, Brust	Weiß.
Bauch, Flanken	Weiß.
Rücken	Weiß.
Flügel	Weiß.
Bürzel	Weiß.
Schwanz	Weiß.
Augen	Schwarz
Schnabel	Fleischfarben
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Fleischfarben

Haussperling männlich ~ *Mutation Satine* ~

Größe : 14.5 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Krone	Schmutzig weiß
Augenbrauenstreifen	Rotbraun
Wangen	Elfenbeinfarben
Kehle	Hellbraunes Lätzchen
Brust, Bauch, Flanken	Fleischfarben
Rücken	Hintergrundfarbe elfenbein mit einer braun beigen Zeichnung
Gefieder	Elfenbeinfarben
Decken	Kleine beige hellbraun. Mittlere weiß, bilden ein Flügelband. Große Elfenbeinfarbe
Schwanz	Elfenbeinfarben
Bürzel	Elfenbeinfarben
Augen	Rot
Schnabel	Fleischfarben
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Fleischfarben



Photo UOF

Haussperling weiblich
~ Mutation Satine ~

Größe : 14.5 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Krone	Elfenbein hell gestreift
Augenbrauenstreifen	Elfenbeinfarben
Wangen	Elfenbeinfarben
Kehle	Fleischfarben
Bauch, Brust, Flanken	Fleischfarben
Rücken	Hintergrundfarbe elfenbein mit einer hellbeigen Zeichnung
Gefieder	Elfenbeinfarben
Decken	Kleine beige hellbraun. Mittlere weiß, bilden ein Flügelband. Große Elfenbeinfarben
Schwanz	Elfenbeinfarben
Bürzel	Elfenbeinfarben
Augen	Rot
Schnabel	Fleischfarben
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Fleischfarben

Feldsperling (Passer montanus) ~ Phénotype wildfarben ~

Größe : 13.5 - 14 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Oberkopf, Nacken	Schokoladenbraun
Kopf- und Halsseite	Weiß mit schwarzen Flecken auf den Wangen
Bereich zwischen Schnabel und Auge, Linie unter dem Auge, Kinn	Schwarz
Schulter	Braun
Brust	weißlich grau
Flanke, unt. Schwanzfeder	Braun
Rücken	Hoher brauner Rücken mit schwarzen Streifen. Flacher grau brauner Rücken.
Gefieder	Primäre und sekundär braun mit rot umrandet.
Decken	Große: gelbbraun mit schwarzen, entlang der äußeren Federkiele und weißlicher Spitze. Mittlere: schwarz mit weißlicher Spitze. Kleine: rötlich-braun.
Schwanz	Dunkel gelblich-braun mit braun umrandet
Bürzel	Graubraun
Augen	Dunkelbraun
Schnabel	Im Sommer schwarz und im Winter dunkelbraun mit gelb an der Basis des Unterschnabels
Ständer	Hornfarben
Krallen	Schwarz



Geschlechtsunterschiede: keine.

Feldsperling ~ *Mutation Opal* ~

Größe : 13.5 - 14 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Stirn, Scheitel, Nacken	Blaugrau
Wangen	Silbergrau mit einem blau-grauen Fleck.
Kehle	Silber mit blau-grauem Lätzchen.
Brust	Silbergrau
Bauch	Schmutzig weiß
Flanken	Silbergrau
Rücken	silbergrau blau grau gestreift
Gefieder	Silbergrau
Decken	Klein : blau grau, Mittel : silbergrau mit weißem Flügelband, Groß : silbergrau
Schwanz	Silbergrau
Bürzel	Silbergrau
Augen	Braun schwarz
Schnabel	Blau grau mit gelb an der Basis.
Ständer	Dunkel fleischfarben
Krallen	Dunkel fleischfarben

Geschlechtsunterschiede: keine.



photo Driemans

Feldsperling ~ *Mutation braun* ~

Größe : 13.5 - 14 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Stirn, Scheitel, Nacken	Hellbraune Haselnuss
Wangen	Weiß mit einem dunkelbraunen Fleck in der Mitte.
Bereich zwischen Schnabel und Auge	Dunkelbraun
Kehle	Dunkelbraun mit weißen Latz.
Brust	Isabell
Bauch	Weiß
Flanken, Bürzel	Mittelbraun gelb
Rücken	Gelb mittelbraun, gestreift mit dunkelbraun.
Gefieder	Braun gelb
Decken	Kleine : hellbraun, Mittlere : mittelbraun gelb mit weißem Rand (und damit eine Flügelbandform). Große : gelb mit einem dunkelbraunen Rand.
Schwanz	Gelb mittelbraun
Augen	Dunkelbraun
Schnabel	Braun und gelb an der Basis.
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Fleischfarben

Geschlechtsunterschiede: keine.



Feldsperling ~ *Mutation braun opal* ~

Größe : 13.5 - 14 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Stirn, Scheitel, Nacken	Braun beige
Wangen	Weiß grau beige mit braunem Fleck in der Mitte.
Kehle	Weiß grau mit beige braunem Lätzchen.
Brust	Weiß grau mit einem hellbeige Schleier.
Bauch	Weiß grau mit einem hellbeige Schleier.
Flanken	Weiß grau mit einem hellbeige Schleier..
Rücken	Grauer Mantel, braun beige gestreift.
Gefieder	Weiß grau beige. Weiß-graue Seite mit einem beige braunen Rand.
Decken	Kleine : braun beige, Mittlere und Große : weiß-grau mit braun-beige Rand
Bürzel	Braun beige
Schwanz	trübe grau beige
Augen	Braun schwarz
Schnabel	Dunkelbraun
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Fleischfarben

Geschlechtsunterschiede: keine.



Weidensperling ~ *Passer hispaniolensis* ~

Größe : 14.5 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Schnabel	Im Winter : graubraun mit gelber Wurzel. Im Sommer: schwarz. Form: konisch und robust.
Augen	Schwarz
Kopf	Stark mit flachem, breiten Hals. Groß, schwarze lorale Linie, verjüngend zum hinteren Teil des Auges. Am Ende weißen Augenbrauenlinie. Stirn, oberer Kopf und Hals: braun. Die Zeichnung geht auf der Rückseite der Wange weiter. Wangen: hellgrau weiß schattiert.
Rücken	schwarz auf beige grauen Hintergrund
Kehle	Einheitlich schwarz
Brust	Schwarz, bis Unterbauch, variable schwarze Zeichnung auf der Brust
Flanken	Große schwarze Federn auf weißem Hintergrund grau markiert
Bauch	Weißlich
Flügel	Primärfarben: schwarz grau, mit braunen Rand. Die Sekundären sind kantig und breiter. Die Decken sind rötlich mit weißem Rand umrandet, die Handdecke ist breiter und bildet ein Flügelband.
Bürzel	Dunkelgrau
Schwanz	Grau-schwarze Federn, schwarz gesäumt.
Ständer	Dunkelbraun grau
Krallen	Grau schwarz
Allgemeine Form	Ein wenig schlanker als der Haussperling. Robust und elegant.

Geschlechtsunterschiede: Das Weibchen ähnelt dem Chipping Sparrow mit einer dunkleren Rückseite. Folge Flanken und loral Linie sind gekennzeichnet.

Art *Petronia*

Steinsperling ~ *Petronia petronia* ~

Größe : 14 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Schnabel	Konisch und robust. Dunkler ockergelber Oberkiefer, Unterkiefer hornfarben. Die Spitze des Oberkiefers ist dunkler.
Augen	Dunkelbraun
Kopf	Flach, breiter Halsausschnitt. Oben beige grauer Schädel, auf jeder Seite von einem dunklen graubraunen Längsband, das sich an den Hals streckt, begrenzt. Die beiden Streifen sind auf der Vorderseite verbunden. Augenbrauen und Schnurrbart: beige, sehr klar. Wangen : grau braune Zeichnung.
Rücken	Beige grau, markiert mit dunkelbraunen sehr klaren Zeichnungen in grau.
Kehle	Beige grau, hervorgehoben an der Basis durch eine mehr oder weniger klare gelbe längliche Stelle.
Brust	Grau beige, leicht gesäumt
Flanken	Grau beige, mit dunkleren Zeichnungen
Bauch	Beige, braun markiertem Analbereich
Flügel	Primärfarben Schwungfedern und Decken: schwarz-braun, beiger Rand. Äußere Sekundärfedern sind bis an ihr Ende markiert sehr hellbeige. Seitenteile: werden breit mit einem sehr hellen beigen Rand
Bürzel	Beige mit braun gestreift
Schwanz	Ganz kurz. Schwarzbraune mit grau eingefasste Federn, beige weiß gesäumt an der Spitze.
Ständer	Dunkelbraun
Krallen	Grau schwarz
Allgemeine Form	Robust und stämmig.



Art *Montifringilla*

Schneefink ~ *Montifringilla nivalis* ~

Größe : 17 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Schnabel	Konisch, ziemlich robust und scharf. Gelb an der Basis und an der Spitze schwärzlich. Der Schnabel wird im Sommer komplett schwarz
Augen	Schwarz
Kopf	Kappe: Schädel, Hals und Wangen grau Schiefer. Bereich zwischen Schnabel und Augen: schwarz-grau. Latz: schwärzlich, im Sommer deutlicher als im Winter. Kinndecken sind am unteren Rand abgerundet. Der Latz wird von der grauen Kopfseite durch eine schräge hellgraue Linie getrennt, die Zeichnung mischt sich mit der Farbe der Brust.
Rücken	Dunkelbraun, scharfer Kontrast zu dem dunkelgrau des Halses. Die Rückenfedern sind heller als in der Mitte, die eine sehr regelmäßige Zeichnung des gesamten Gefieders hat.
Brust	Das gleiche hellgrau, von der Basis der Wangen hin bis zum Bauch .
Flanken	In der Umgebung des Schwanzes grau, an der Brust noch deutlicher
Bauch	Schmutziges weiß um den Analbereich
Flügel	Decken- und Sekundärschwungfedern: Schmutziges weiß, interne Sekundärfedern sind dunkelbraun mit hellerem Rand. Primärfarben: Schwarz auf zwei Drittel ihrer Länge und weiß an ihrer Basis. Grundfedern: schwarz, die einen sehr kurzen weißen Spiegel aufweist. Die Flügel sind lang genug, und bedecken den Schwanz bis zu zwei Drittel.
Bürzel	Schwärzlich



Schwanz	Die beiden mittleren Schwanzfedern sind bei Jugendlichen und Erwachsenen bräunlich schwarz. Alle anderen sind weiß mit schwarzer Spitze, ca. 1 cm. Der Schwanz ist mittellang und leicht eingerückt.
Ständer	Schwarz
Krallen	Schwarz
Allgemeine Form	Robuster kräftiger Vogel

**Geschlechtsunterschiede: Es gibt keine ausgeprägten geschlechtsspezifischen Unterschiede.
Das Lätzchen der Frau ist nur sehr wenig ausgeprägt.**

Mängel der männlichen und weiblichen Niverolles

- * **Mangel an Klarheit in der Zeichnung.**
- * **Flanken völlig fehlen (vorbehaltlich Jugendkleid vor der ersten Mauser).**
- * **Zeichnung schlecht definiert.**
- * **Flügel gekreuzt oder anhängig.**

Bombycillidés

Seidenschwänze

ART *Seidenschwanz*

Seidenschwanz (Bombycilla garrulus)
 ~ *Phénotype wildfarben* ~

Größe : 18 cm

Bereiche und Gefieder	Farbe
Schnabel	schwarz, Spitze hautfarben mit einer weißen Linie am Unterkiefer
Augen	dunkelbraun
Kopf	Haube grau mit rotbraun, um die Augen bis Oberschnabel schwarz, Kehllatz schwarz
Rücken	Grau, bräunlich überhaucht
Brust	Blass bräunlich grau
Bauch und Flanken	Blass bräunlich. Das Zentrum des Bauches ist grau.
Flügel	Oberdecke bräunlich grau. Handschwinge schwarz mit weißen Zeichnungen und gelblichen Ränderungen an den Enden wobei die Zeichnung der inneren Handschwinge mit roten Federspitzen versehen sind.
Schwanz	Oberseite gräulich, ab Schwanzmitte schwarz mit gelblicher Säumung an den Enden. Unterseite braun.
Ständer und Krallen	Schwarz



Photo UOF

Turdidés

Amsel

Art *Drossel*

Amsel männlich (Turdus merula)
~ Phénotype wildfarben ~

Größe : 24/25 cm

Bereiche und Gefieder	Farbe
Kopf	schwarz
Rücken	schwarz
Kehle, Brust	schwarz
Flanke, Bauch	schwarz
Flügel	Schwarz, im ersten Jahr schwarz-braun
Bürzel	Schwarz, im ersten Jahr schwarz-braun
Schwanz	Schwarz, im ersten Jahr schwarz-braun
Augen	Schwarz mit orangefarbenen Augenring
Schnabel	Gelb-orange
Ständer und Krallen	Grau-braun



Amsel weiblich (Turdus merula)
~ Phénotype wildfarben ~

Größe : 24/25 cm

Bereiche und Gefieder	Farbe
Kopf	Dunkelgrau-braun
Rücken	Dunkelgrau-braun
Brust, Kehle	Grau schwarz punktiert
Flanke, Bauch	Dunkelbraun geschuppt
Flügel	Dunkelgrau-braun
Bürzel	Dunkelgrau-braun
Schwanz	Dunkelgrau-braun
Augen	Braun schwarz
Schnabel	Dunkelbraun mit gelblichen Markierungen
Ständer und Krallen	dunkelbraun



Photo Lionel Durochat

Amsel männlich
~ *Mutation pastel* ~

Größe : 24/25 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Grau, leicht gestreift
Rücken	grau mit silberner Säumung auf dunkel und hell gestreiften Federn
Brust, Kehle	Silbergrau mit leichten unterbrochenen Streifen
Flanken, Bauch	Silbergrau, Zeichnung in Tropfenform
Flügel	Federn dunkelgrau mit einem hellgrauen primären Flügel (junge Vögel haben dunkle Schulterfedern).
Bürzel	Silbergrau mit dunklem Rand
Schwanz	Dunkelgrau
Augen	Dunkelbraun mit gelbem Augenring
Schnabel	Orange bei Altvögeln
Ständer/Krallen	Braun



Amsel weiblich
~ Mutation pastell ~

Größe : 24/25 cm

Bereiche und Gefieder	Farbe
Kopf	dunkelgrau mit leichtem Pigment
Rücken, Brust, Kehle	dunkelgrau
Flanken, Bauch	Dunkelgrau mit einer Zeichnung in Tropfenform
Flügel	Dunkelgrau (Jungvögel haben noch dunklere Flügel)
Bürzel	Dunkelgrau leicht gestreift
Schwanz	Dunkelgrau
Augen	Dunkelbraun mit leicht orangenem Augenring
Schnabel	Dunkelbraun mit blass orange
Ständer und Krallen	Braun



Amsel schwarz
~ *Mutation ino (ex-albino)*~

Größe : 24/25 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Körper	Weiß
Flügel	Weiß
Schwanz	Weiß
Augen	Rot mit gelbem Augenring
Schnabel	Gelb
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Fleischfarben

Reines weiß mit roten Augen wird als Albino bezeichnet.



Amsel schwarz
~ Mutation weiß ~

Größe : 24/25 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Körper	Weiß
Flügel	Weiß
Schwanz	Weiß
Augen	Schwarz mit gelbem Augenring.
Schnabel	Gelb
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Fleischfarben



Photo Driesmans

Singdrossel (*Turdus philomelos*)
~ Phénotype wildfarben ~

Größe : 23 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Scheitel und Hinterkopf mittelraun. Scheitel mit dunkelbraunen Punkten. Augenbrauen und Augenring cremefarben.
Kehle	Beige. Durch zwei dunkle Linien begrenzt.
Rücken	Mittelbraun. Brauner Bürzel und Unterschwanz
Brust	Hellbeige. Zeichnung : dunklebraune Formpfeilspitze
Decken	Hellbrauner Ränder
Gefieder	Dunkelbraun. Helle Außenränder
Bürzel	Braun
Schwanz	Dunkelbraun
Augen	Dunkelbraun
Schnabel	Braun schwarz. An der Basis gelblich
Ständer	Rose fleischfarben
Krallen	Dunkel



Singdrossel
~ Mutation braun ~

Größe : 23 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Hellbraun
Kehle	Cremerfarben
Rücken	Hellbraun
Brust	Cremerfarben mit hellbraunen Muster in Form von Tropfen.
Decken	Kleine und mittlere Decken hellbraun. Große Decke hellbraun. Cremerfarbenes Schulterblatt
Gefieder	Hellbraun
Bürzel	Hellbraun
Schwanz	Hellbraun
Augen	Braun
Schnabel	Fleischfarben
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Fleischfarben



Photo UOF

Singdrossel
~ *Mutation weiß* ~

Größe : 23 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Körper	Reinweiß ohne Zeichnung
Flügel	Weiß
Schwanz	Weiß
Augen	Rot
Schnabel	Fleischfarben
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Fleischfarben

Hinweis: Es gibt auch eine Albino-Mutation, die von der Mutation weiß mit roten Augen unterscheidet.



Photo Driesmans

Singdrossel ~ *Mutation Satine* ~

Größe : 23 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Hell cremefarben mit hellbraunen Schuppen auf dem Scheitel und einem hellbraunen Schleier auf den Wangen.
Kehle	Hell cremefarben. Hellbrauner Schnurrbart auf jeder Seite des Halses.
Rücken	Cremefarben
Brust, Flanken	Hell cremefarben mit hellbrauner Zeichnung auf der Brust in Tropfenform.
Decken	Hell cremefarben mit einer Schulterzeichnung und einer hellbraunen Flügelleiste.
Bürzel	Hell cremefarben
Schwanz	Hell cremefarben mit sichtbarer hellbrauner Zeichnung auf der Schwanzdecke.
Augen	Dunkelrot
Schnabel	Fleischfarben
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Fleischfarben



Misteldrossel
~ *Turdus viscivorus* ~

Größe : 27 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Schnabel	Dunkel Hornfarben, an der Basis des Unterschnabels gelb
Augen	Braun mit grau-weißen Augenring
Kopf	Graubraun bis braun. Bereich zwischen Schnabel und Auge: weiß grau. Ohrregion : dunkler mit weiß-grauen Rändern.
Rücken	Grau-braun mit einem helleren gelblichen Farbton.
Kinn und Kehle	Gelblich-braun mit einer Zeichnung von kleinen dunkelbraunen Flecken. Schnurrbart: dunkelbraun und nicht sehr klar
Brust	Die obere Brust ist gelblich mit einer Zeichnung von kleinen dunkelbraunen Flecken in Form von Pfeilspitzen.
Bauch und Flanken	Braungelb mit einer Zeichnung von dunkelbraunen Flecken
Flügel	Federn dunkelbraun mit einem helleren Rand entlang der äußeren Federkiele. Das Ende der Federn ist weißlich. Große, mittlere und kleine Decken sind dunkelbraun mit einem helleren Rand.
Schwanz	Federn grau-braun mit aufgehelltem Rand entlang der äußeren Federkiele.
Bürzel	Braun bis graubraun
Untere Schwanzfeder	Braun mit grau-weißem Rand.
Ständer	Bräunlich gelb.
Krallen	Dunkel



Geschlechtsunterschiede: Es gibt keine ausgeprägten geschlechtsspezifischen Unterschiede.

Klassische Mängel der männlichen und weiblichen Drosseln

- * Brustzeichnung.
- * Unregelmäßige Augenbrauen.
Unregelmäßige Augenringe.
- * Zeichnung Decken nicht klar.

Rotdrossel ~ *Turdus iliacus* ~

Größe : 21 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Schnabel	Dunkelbraun mit gelblicher Basis des Unterschnabels
Augen	schwärzlich
Kopf	Regelmäßig lange cremefarbene Augenbrauen. Schnurrbärte Creme. Bereich zwischen Schnabel und Augen dunkelbraun. Ohrenbereich dunkelbraun mit cremefarbenen Schatten. Langer cremefarbener Strich unter dem Auge. Kappe dunkelbraun mit schwarzen Schuppen.
Hals	Dunkelbraun mit einem beigefarbenen Fleck auf jeder Halsseite.
Mantel	Dunkel mit einer hellbraunen Zeichnung.
Bürzel	Braun, ein wenig heller als der Mantel.
Untere Schwanzfeder	Braun, ein wenig heller als der Mantel.
Kinn und Kehle	Schmutzig weiß mit einem braunen Streifenmuster. Der Hals hat ein schwärzliches Band und ist von Barthaaren umgeben.
Brust	Schmutzige Weiß dunkelbraun gefleckt
Flanken	Rötlich an der Oberseite und an der unteren Flanke schmutzig weiß mit braun gestreift
Bauch	Weißlich
Flügel	Dunkelbraun mit beige an den äußeren Schwungfedern. Große Flügel oben sind gesäumt beige.



Schwanz	Dunkelbraun
Untere Schwanzfeder	Schmutzig weiß mit einer braunen Zeichnung
Ständer	Dunkel fleischfarben
Krallen	Schwarz

Geschlechtsunterschiede: Es gibt keine ausgeprägten geschlechtsspezifischen Unterschiede.

Fehler der Rotdrosseln und weiblichen Drosseln

- * **Augenbrauen unregelmäßig.**
- * **Brustzeichnung.**
- * **Flügelleiste unregelmäßig.**
- * **Unregelmäßige Bärte.**
- * **Farbe der Flanken nicht sichtbar genug.**

Wacholderdrossel ~ *Turdus pilaris* ~

Größe : 25 cm

Bereich des Gefieders	Farbe
Schnabel	Gelb und orangefarbenen am Ende des braunschwarzem Oberschnabels
Augen	Dunkelbraun
Kopf	Stirn und Scheitel: graublau mit einer schwarzen pfeilförmige Zeichnung Bereich zwischen Schnabel und Augen : schwarz. Abschnitt unter dem Auge: schwarz. Augenbrauen: weiß grau. Hellgrauer Schleier über dem Ohrenbereich. Hals und Hinterkopf: graublau
Rücken	Mantel und Decken dunkelbraun mit helleren Rändern.
Bürzel	Grau-blau. Zusätzliche Schwanzfeder: bräunlich
Kinn und Hals	Rötlich gelb mit einer spitzenförmigen schwärzlichen Pfeilzeichnung
Brust	Mittelbraun mit einer Zeichnung in Form von großen schwarzen Speerspitzen.
Bauch	Weißlich
Flanken	Mittelbraun mit einer Zeichnung in Form von großen schwarzen Eisenlanzen
Flügel	Schwarze Federn mit braun grauen Außenrändern. Die Sekundärfedern sind weißlich.
Schwanz	Dunkelbraune Federn mit helleren Streifen an den äußeren Schwanzfedern.
Ständer	Braun
Krallen	Dunkelbraun



Photo KBOF

Geschlechtsunterschiede: Das Weibchen hat die gleichen Eigenschaften wie die männlichen, nur die Grauteile des Mannes sind bei Frauen braun. Schwarze Zeichnungen am Kopf sind kleiner. Die Flanken sind bräunlich.

Sturnidés

Stare

Art *Sturnus*

Star (Sturnus vulgaris)
~ *Phénotype wildfarben* ~

Größe : 21.5 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Schwarz schillernd weiß punktiert. Winter: braune Spiegelung
Rücken	Schwarz schillernd weiß punktiert. Winter: braune Spiegelung
Hals, Brust	Schwarz schillernd weiß punktiert. Winter: braune Spiegelung
Flanken, Bauch	Schwarz schillernd weiß punktiert. Winter: braune Spiegelung
Flügel	Sommer: schwarz brauner Rand. Winter: braune Spiegelung
Bürzel	Sommer: schwarz weiß punktiert. Winter: braune Spiegelung
Schwanz	Sommer: schwarz brauner Rand. Winter : bräunlicher
Augen	In der Nähe des Schnabels dunkelbraun
Schnabel	Sommer: Zitronengelb. Winter: dunkelgrau, gelber Grund
Ständer, Krallen	Sommer: rot-braun. Winter: dunkelgrau




Photo Driesmans

Star
~ *Mutation braun* ~

Größe : 21.5 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Sommer: schwarzbraun weiß gepunktet Winter : braun verschleiert
Rücken, Hals, Brust	Sommer: schwarzbraun weiß gepunktet Winter : braun verschleiert
Flanken	Sommer: schwarzbraun weiß gepunktet Winter : braun verschleiert
Flügel	Schwarzbraun, im Winter sichtbare braune Ränder
Bürzel	Sommer: schwarz-braun weiß gepunktet. Winter: braun verschleiert
Schwanz	Schwarzbraun, im Winter sichtbare braune Ränder
Augen	Schwarz
Schnabel	Sommer: gelblich. Winter : braun grau
Ständer, Krallen	Graubraun

photo *Orizsmans*



Star
~ *Mutation Achat* ~

Größe : 21.5 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Dunkelgrau (blau) mit beige gepunktet.
Rücken	Grau-braun mit beige gepunktet.
Hals	Cremeweiß
Flanken, Brust	Dunkelgrau mit weißen Punkten.
Flügel	Grau-braun. Die Enden der Primärfarben sind dunkler. Hellere Sekundärfarben, mit hellbraunem Rand.
Bürzel	Dunkelgrau, beige-graue Ränder.
Schwanz	Dunkelgrau, mit beige-grauen Federn
Augen	Dunkelbraun mit gelb-brauner Pupille.
Schnabel	Hellgrau bis gelb
Ständer	Fleischfarben
Krallen	Hornfarben

Photo Driesmans



Star
~ ***Mutation phaèò*** ~

Größe : 21.5 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Cremweißfarben mit einer Zeichnung von weißen Schuppen und mit einem braunen Rand, der ein braun und weiß gepunktetes Aussehen verleiht.
Rücken, Hals, Brust	Cremweißfarben mit einer Zeichnung von weißen Schuppen und mit einem braunen Rand, der ein braun und weiß gepunktetes Aussehen verleiht.
Flanken	Cremweißfarben mit einer Zeichnung von weißen Schuppen und mit einem braunen Rand, der ein braun und weiß gepunktetes Aussehen verleiht.
Flügel	Primär: weiße Schwungfedern mit einem hellbraunen Rand. Sekundär : weiß mit einem breiteren braunen Rand. Beige Decken mit einem breiten braunen Rand.
Bürzel	Beige mit braunen Schuppen.
Schwanz	Hellbraun
Augen	Rot
Schnabel	Sommer: gelblich. Winter: hellgrau
Ständer, Krallen	Fleischfarben



Photo Driesmans

Star
~ *Mutation weiß* ~

Größe : 21.5 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Mattweißes Aussehen, wie gepunktet
Rücken, Hals, Brust	Mattweißes Aussehen, wie gepunktet
Flanken	Mattweißes Aussehen, wie gepunktet
Flügel	Weiß
Bürzel	Weiß
Schwanz	Weiß
Augen	Schwarz
Schnabel	Grau rosa
Ständer, Krallen	Rosafarben



Star
~ *Mutation Pastell* ~

Größe : 21.5 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Sommer: silbergrau weiß gepunktet Winter : beige verschleiert
Rücken, Hals, Brust	Sommer: silbergrau weiß gepunktet Winter : beige verschleiert
Flanken	Sommer: silbergrau weiß gepunktet Winter : beige verschleiert
Flügel	Silbergrau hell beige Rand, im Winter sichtbarer
Bürzel	Sommer: grau weiß gepunktet. Winter : beige verschleiert
Schwanz	Silbergrau beige Rand, im Winter sichtbarer
Augen	Schwarz
Schnabel	Sommer: hellgelb. Winter: rosa-grau.
Ständer, Krallen	Hellgrau



Photo Driesmans

Corvidés

Rabenvögel

Art *Garrulus*

Eichelhäher (Garrulus glandarius)
~ Phénotype wildfarben ~

Größe : 34 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Beige-grau schwarz gestreift auf dem Schädel. Beige rosa Wangen. Schwarzer Schnurrbart. Das Kinn weißlich.
Rücken, Hals, Brust	Rücken grau beige. Hell beige Brust.
Flanken	rosa-beige
Flügel	Schulter blau-schwarz gestreift. Schwarz-weiße Außenflügel.
Bürzel	Weiß. Weißer Bauch
Schwanz	Schwarz
Augen	Schwarz. Grauer Augenring
Schnabel	Dunkelgrau
Ständer, Krallen	Hellgrau beige



photo **Orijsmans**

Eichelhäher ~ *Mutation Opal* ~

Größe : 34 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Kopf	Silbergrau mit einem hellen rosa-braunen Schleier, gestreift mit dunkelgrau. Der Vogel kann den geformten Kamm erhöhen. Zwei große dunkelgrauen Barthaare.
Hinterkopf	Hellbraun mit einem rosa Schleier
Kehle	Schmutzig weiß
Rücken	Silbrig weißen Mantel mit einem hellgrauen Schleier.
Brust, Flanken	Silber mit einem hellgrauen Schleier.
Flügel	Primär: Schwungfedern leuchten silbergrau, außen grau. Sekundär : hellgrau mit hellerem Rand. Zeichnung charakteristisch für hellere blaue Flügel, aber immer noch sichtbar.
Bürzel	Weiß
Schwanz	Hellgraue und dunkelgraue Oberschwanzdeckfedern
Augen	Hellblau mit dunkelgrauem Augenring.
Schnabel	Dunkelgrau
Ständer	Dunkel fleischfarben
Krallen	Helle Hornfarbe



Photo Driesmans

Art *Pica*
Elster

Elster (Pica pica)
~ *Phénotype wildfarben* ~

Größe : 48 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Schnabel	Schwarz mit schwarzen Borsten
Augen	Schwärzlich
Kopf – Hals - Rücken – Kehle - Beine bis Brust und untere Schwanzfeder	Schwarz glänzend
Kopf und Schulterfedern	Schwarz mit grünlich-violetten Schimmer.
Die Brust abwärts - Bauch - Flanken und große Federn	Weiß
Flügel	Primär-und Sekundärschwungfedern: schwarz mit einem metallischen Glanz
Schwanz	Federn: lang und schwarz mit metallischen Spiegelungen

**Hinweis: Die ersten äußeren Schwungfedern
sind immer kürzer als der anderen.**



Elster (Pica pica)
~ Mutation braun ~

Größe : 48 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Schnabel	Braun mit braunen Borsten
Augen	Braun
Kopf – Hals - Rücken – Kehle - Beine bis Brust und untere Schwanzfeder	Braun
Schulterfedern	braun
Die Brust abwärts - Bauch - Flanken und große Federn	Weiß
Flügel	Primär-und Sekundärschwungfedern: braun
Schwanz	Federn: braun

Hinweis: Die ersten äußeren Schwungfedern
sind immer kürzer als der anderen.



Art *Corvus*

Raben und Krähen

Dohle (Corvus monedula)
~ Phénotype wildfarben ~

Größe : 33 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Schnabel	Schwarz mit schwarzen Borsten
Augen	Blau grau mit schwarzer Pupille.
Stirn und Kappe	Schwarz bläulich
Nacken und Wangen	Silbergrau
Rücken	Schwarz mit bläulichen Spiegelungen.
Mantel – Bürzel – untere Schwanzfeder	Schwarz mit metallischen Spiegelungen.
Hals - Kinn - Bauch und Flanken	Schwarz
Flügel	Schwarz mit einem bläulichen Schimmer.
Schwanz	Schwarz
Ständer	Schwarz
Krallen	Schwarz

Hinweis: Die Flügelspitze berührt fast die Spitze des Schwanzes.
Die ersten drei Primärfedern sind nach und nach kleiner als die Folgende.



Photo Philippe ROCHER

Rabenkrähe (Corvus corone corone) ~Phénotype wildfarben ~

Größe : 47 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Schnabel	Schwarz mit schwarzen Borsten. Die Spitze des oberen Schnabels ist mehr oder weniger gekrümmt.
Augen	Schwarz
Gefieder und Körper	Komplett schwarz mit violetten Spiegelungen.
Kehle	Die Federn der Kehle und der Halsseiten sind etwas länglich und spitz.
Flügel	Die Primär- und Sekundärschwungfedern sind schwarz mit grünlichen Spiegelungen.
Schwanz	Die Schwanzfedern sind schwarz und abgerundet.
Ständer	Schwarz
Krallen	Schwarz



Keine Geschlechtsunterschiede

Mängel der männlichen und weiblichen Vögel:

- * Borsten beschädigt .
- * Kein Glanz.



Saatkrähe (Corvus frugilegus) ~Phénotype wildfarben ~

Größe : 48 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Schnabel	Schwarz. Der Schnabel ist gerader und schlanker als die schwarze Krähe. Er hat die Basis des knöchernen Schnabels (weißlich grau). Der Ansatz des Schnabels bezieht sich auf das zweite Jahr, so dass im Jugendkleid, hat der Turm keine knöcherne Basis des Auslauf.
Augen	Schwarz
Gefieder und Körper	Komplett schwarz mit violetten Spiegelungen.
Flügel	Die Primär- und Sekundärschwungfedern sind schwarz mit violetten Spiegelungen.
Schwanz	Die Schwanzfedern sind schwarz und abgerundet.
Ständer	Schwarz
Krallen	Schwarz



Kein Geschlechtsunterschied

Beachten Sie: Ein typisches Merkmal der Saatkrähe ist das Unterkleid (Gefieder locker Oberschenkel NB - nicht zu bestrafen.).

Vorsicht bei der Zusammensetzung der Flügelrabenvögel :

1. Die erste Messung Gefieder Hälfte der Länge des zweiten.
2. Die zweite Messung Gefieder drei Viertel der Länge der ersten
3. Die dritte und vierte Primär sind die beiden längsten

?????

In dem Urteil der Rabenvögel ist zu berücksichtigen, diese Funktion zu nehmen und nie schreiben: "Mischung zu kurz oder das Nachwachsen"

Nebelkrähe (Corvus corone cornix) ~ *Phénotype wildfarben* ~

Größe : 47 cm

Bereiche des Gefieders	Farbe
Schnabel	Schwarz, mit schwarzen bedeckten Borsten
Augen	Schwarz
Mantel	Kopf, Nacken, Hals und Oberbrust sind schwarz mit einem metallischen Glanz. Andere Teile: Rücken, Bauch, Flanken und Schwanz sind grau blau.
Kehle	Die Federn des Halses und der Halsseiten verjüngen sich und sind spitz
Flügel	Die Decken, Primär- und Sekundärfedern sind schwarz.
Schwanz	Die Schwanzfedern sind schwarz und abgerundet.
Ständer	Schwarz
Krallen	Schwarz



Geschlechtsunterschiede: Es gibt keine ausgeprägten geschlechtsspezifischen Unterschiede.

Klassische Mängel

- * **Borsten beschädigt .**
- * **Decken unregelmäßigen Mantel**

Zeichnung blau grau unregelmäßigen Teile.

Kolkrabe (Corvus corax) ~ *Phénotype wildfarben* ~

Größe : 64 cm



Bereiche des Gefieders	Farbe
Schnabel	Schwarz, mit schwarzen bedeckten Borsten
Augen	Schwarz
Mantel	Kopf, Nacken, Hals und Oberbrust sind schwarz mit einem metallischen Glanz. Andere Teile: Rücken, Bauch, Flanken und Schwanz sind schwarz.
Kehle	Die Federn des Hals und Halsseite sind verjüngt und spitz.
Flügel	Die Decken, Primär- und Sekundärfedern sind schwarz.
Schwanz	Die Schwanzfedern sind schwarz und abgerundet.
Ständer	Schwarz
Krallen	Schwarz

Geschlechtsunterschiede: Es gibt keine ausgeprägten geschlechtsspezifischen Unterschiede.

Klassische Mängel

- * Borsten beschädigt.
- * Die Abgrenzung des unregelmäßigen Mantel



« Topographie » d'un oiseau




FORMES ET TAILLES



Sizerin flammé 135 - 140 mm



Sizerin cabaret 125 - 135 mm



bouvreuil
145 - 165 mm



Tarin des aulnes
115 - 125 mm



Pinson des arbres
150 mm
Pinson du Nord
160 mm



Verdier 145 - 170 mm

Mutationen der europäischen Vögel, von der COM / OMJ genehmigt

Tarin des aulnes (*Carduelis spinus*)

Phénotype « sauvage »	Dominant
Brun	Récessif, lié au sexe
Agate	Récessif, lié au sexe
Isabelle	Récessif, lié au sexe
Facteur « dilué & double dilué »	Dominant, autosomal
Ivoire	Récessif, lié au sexe

Sizerin Flammé (*Carduelis flammea*)

Sizerin Blanchâtre (*Carduelis hornemanni*)

Phénotype « sauvage »	Dominant
Brun	Récessif, lié au sexe
Pastel (Agate)	Récessif, lié au sexe
Brun pastel (isabelle)	Récessif, lié au sexe
Ecaillé (pastel)	Récessif, lié au sexe
Facteur « foncé »	Dominant, autosomal
Phaéo	Récessif, autosomal

Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*)

Phénotype « sauvage »	Dominant
Isabelle	Récessif, lié au sexe
Agate	Récessif, lié au sexe
Brun	Récessif, lié au sexe
Satiné	Récessif, lié au sexe
Lutino	Récessif, lié au sexe
Facteur « Pastel »	Récessif, lié au sexe

Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*)

Phénotype « sauvage »	Dominant
Brun	Récessif, lié au sexe
Agate	Récessif, lié au sexe
Facteur « Pastel »	Récessif, lié au sexe
Isabelle	Récessif, lié au sexe
Satiné	Récessif, lié au sexe
Lutino	Récessif, lié au sexe
Blanc masque orange	Récessif, autosomal
Tête blanche	Récessif, autosomal

Jaune	Dominant, autosomal
Aminet (eumo)	Récessif, lié au sexe**

Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*)

Phénotype « sauvage »	Dominant
Brun	Récessif, lié au sexe
Agate	Récessif, lié au sexe
Opale	Dominant, autosomal

Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*)

Phénotype « sauvage »	Dominant
Facteur « pastel »	Récessif, lié au sexe
Brun	Récessif, lié au sexe
Jaune	Récessif, autosomal
Blanc	Récessif, autosomal
Topaze	Récessif, autosomal

Moineau domestique (*Passer domesticus*)

Phénotype « sauvage »	Dominant
Brun	Récessif, lié au sexe
Phaéo (Yeux rouge)	Récessif, autosomal
Agate	Récessif, lié au sexe
Opale	Récessif, autosomal
Facteur « pastel »	Récessif, lié au sexe
Ino	Récessif, lié au sexe
Blanc (Yeux noirs)	Dominant, autosomal
Satiné	Récessif, lié au sexe

Moineau friquet (*Passer montanus*)

Phénotype « sauvage »	Dominant
Brun	Dominant, autosomal
Facteur « Opale »	Récessif, autosomal

Merle noir (*Turdus merula*)

Phénotype « sauvage »
Pastel
Ino (ex Albino)
Blanc

Dominant
Récessif, lié au sexe
Récessif, lié au sexe
Récessif, autosomal

Brun
Agate
Phaéo
Blanc
Facteur « Pastel »

Récessif, lié au sexe
Récessif, lié au sexe
Récessif, autosomal
Récessif, autosomal
Récessif, lié au sexe

Grive musicienne (Turdus philomelos)

Phénotype « sauvage »
Brun
Blanc
Satiné

Dominant
Récessif, lié au sexe
Récessif, autosomal
Récessif, lié au sexe

Pie bavarde (Pica pica)

Phénotype « sauvage »
Brun

Dominant
Récessif, lié au sexe

Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris)

Phénotype « sauvage »

Dominant

Geai des chênes (Garrulus glandarius)

Phénotype « sauvage »
Opale

Dominant
Récessif, autosomal

Bei den meisten Arten der europäischen Vögel werden andere Mutationen nicht offiziell von den COM / OMJ anerkannt (werden derzeit untersucht)

**Übersetzung aus dem Französischen ins Deutsche :
Ulrike Abel unter Mitwirkung von Rita und Heinz Pelzer
(2013/2014)**